SÍNTESE DE COMPLEXOS ORGANOESTÂNICOS COM α -DIIMINAS E IMINOCETONAS

Leonardo da Cunha Ferreira¹(PG), Jairo Bordinhão (PQ), Carlos Alberto Lombardi Filgueiras(PQ)*

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ-Ilha do Fundão

*e-mail: calf@iq.ufrj.br

Palavras Chave: complexos organoestânicos, diiminas, iminocetonas.

Introdução

Na literatura se encontram vários artigos descrevendo a síntese de ligantes contendo o grupamento 1,4-diazo-1,3-butadieno, $R_1N=C(R_2)-C(R_3)=NR_4$. Esses ligantes foram utilizados para a síntese de vários tipos de complexos, com diferentes características e propriedades¹. Além daquele grupamento, outros ligantes contendo o grupo $R_1N=C(R_2)-C(R_3)=O$ também foram sintetizados, assim como organometálicos contendo estes mesmos ligantes². Embora existam na literatura muitos artigos descrevendo a síntese de compostos de coordenação contendo diiminas e iminocetonas como ligantes, os complexos aqui relatados são os primeiros organoestânicos contendo estes ligantes.

Resultados e Discussão

As α -diiminas e a iminocetona foram sintetizadas a partir de uma condensação entre uma anilina mono ou dissustituída com uma dicetona, com rendimentos em torno de 80%. Os ligantes foram estudados por seus espectros de ¹HRMN, ¹³C RMN e IV. Três desses ligantes tiveram suas estruturas elucidadas por difração de raios X. As reações podem ser descritas pelas equações abaixo.

R' = Alquil
R' = Ar

1: R₁=R₂=i-Pr 2: R₁=R₂=Me
3: R₁=H e R₂=i-Pr 4: R₁=H e R₂=terc-butyl

5: Ar=2,6 i-PrPh
6: Ar=Naftadila

Figura 1: Metodologia e ligantes sintetizados

Os ligantes sintetizados foram utilizados na síntese de complexos organoestânicos, a partir de precursores com a fórmula R_nSnX_{4-n} , em que X=Cl e n = 1-3, obtendo-se 8 complexos. Abaixo estão representadas as estruturas moleculares dos complexos obtidos.

1: R₁=R₂=Me; ML₄=Ph₂SnCl₂
2: R₁=R₂= i-Pr; ML₄=Ph₂SnCl₂
3: R₁=H e R₂=i-Pr; ML₄= Ph₂SnCl₂
4: R₁=H e R₂=i-Pr; ML₄=PhSnCl₃
5: R₁=R₂=i-Pr; ML₄=PhSnCl₃

6: ML₄=Ph₂SnCl₂
7: ML₄= PhSnCl₃

Os complexos foram caracterizados por espectroscopia no IV, p.f., C,H,N e ¹HRMN. Os dados espectroscópicos de IV estão na Tabela 1.

Complexos	ν_{C-N} (cm ⁻¹)	ν_{Sn-Cl} (cm ⁻¹)	ν_{C-O} (cm ⁻¹)
1	1639 ¹	309	-
2	1621	309	-
3	1614	305	-
4	1622	326	-
5	1621	326	-
6	1661	320	1627
7	1661	314	1628
8	1623	316	-

Conclusões

As α -diiminas e a iminocetona apresentaram um interessante comportamento de coordenação com os precursores organoestânicos, formando complexos com o ligante bidentado ou em ponte entre dois átomos de Sn. O metal sempre reage por expansão de seu número de coordenação, que passa de 4 nos precursores a 5 ou 6 nos complexos.

Agradecimentos

CNPq, DQI-UFRJ

- 1]-Koten, G.V.; Vrieze, K., *Advances in Organometallic Chemistry*, **1980**, 21, 151-233.[2]-Poel, H.V.D.; Koten, G.V. *Synth. Commun*, **1978**, 8, 305.
[3]-Heinberg,H.; Johansson, Lars.;Gropen,O., *J.Am.Chem.Soc*, **2000**,122,10831- 10845.
[4]- Vliet, M.R.P.V.; Jastrzebski, J,T,B,H.; Koten, G.V.; Vrieze, K., *Journal of Organometallic Chemistry*, 251, **1983**, 17-21.