Efeitos de grupos substituintes na epoxidação químico-enzimática de cinamatos de etila *para* e *meta* substituídos

Thiago Bergler Bitencourt^{*1} (PG), Maria da Graça Nascimento¹ (PQ), Cláudio Eduardo Rodrigues dos Santos² (PG) e Áurea Echevarria² (PQ) [*thiago06br@yahoo.com.br](mailto:thiago06br@yahoo.com.br)

¹Departamento de Química – Curso de Pós-Graduação – Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade – Florianópolis – SC – Brasil – 88040-900

²Departamento de Química – ICE – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro – Brasil – 23.851-970

Palavras Chave: epoxidação, lipases, cinamatos.

Introdução

Em geral, a epoxidação de olefinas ricas em elétrons é eficiente e o processo é bastante conhecido¹, envolvendo o mecanismo concertado de adição eletrofílica do oxigênio do perácido à ligação dupla carbono-carbono.

Entretanto, olefinas elétron-deficientes requerem na epoxidação um agente nucleofílico tal como HOO⁻, t-BuOO⁻ ou NaClO, requerendo meio alcalino para favorecer a formação do produto epoxidado. Estas reações são denominadas de “epoxidação nucleofílica”.²

Neste trabalho, foi avaliada a formação químico-enzimática de epóxidos derivados do cinamato de etila em função dos grupos substituintes no anel aromático. Como biocatalisador foi utilizada a lipase de *Candida antarctica* (Novozym 435 –10000u/g), em sistema bifásico tolueno/tampão fosfato de potássio pH 9,0. (Eq. 1)

As conversões (%) em epóxidos foram determinadas por RMN-¹H.

X = 4-H, 4-OCH₃, 4-CN, 4-Cl, 4-F, 4-OH, 4-NO₂, 4-CH₃, 3-F, 3-NO₂
(1) = Novozym 435 (150mg), ác. octanóico (10mmol), H₂O₂ 30%(1mL), sistema bifásico tolueno/tampão fosfato de potássio pH = 9,0 (10mL 50% v/v)

Resultados e Discussão

A contribuição do efeito eletrônico foi avaliada através do gráfico da conversão em epóxidos para os diversos cinamatos de etila em função das constantes de Hammett dos grupos substituintes (s)³. Os resultados estão apresentados na Figura 1.

Os resultados demonstraram, que os grupos retiradores de elétrons favorecem a formação do epóxido, formando os produtos em maiores rendimentos.

Figura 1. Conversões em epóxido de cinamatos de etila, em função das constantes de substituinte (σ). [Novozym 435 (150mg), 96h, 30°C, 1mL de H₂O₂, tolueno.]

Utilizando tolueno como solvente, obteve-se r^2 de 19,29, e $r = 0,7424$. Estes dados apoiam o mecanismo proposto para a epoxidação nucleofílica, pois grupos retiradores diminuem consideravelmente a densidade eletrônica na ligação dupla C=C, favorecendo o ataque nucleofílico do ânion peróxido-carboxilato.⁴

Conclusões

Estes resultados evidenciam que a epoxidação dos cinamatos de etila é bastante influenciada pelos grupos substituintes do anel aromático, e que pode ser realizada em condições relativamente suaves de na presença de um biocatalisador. A análise de correlação apresenta-se como uma ferramenta importante na quantificação dessas predições.

Agradecimentos

UFSC, UFRRJ, CNPq, CAPES e Novozymes.

¹ Kim, C.; Traylor, T. G.; Perrin, C. L.; J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9513-9516.

² Reed, A. D.; Hegedus, L. S.; J. Org. Chem., 60, 3787-3794, 1995.

³ March, J.; Advanced organic chemistry, 3. Ed., John Wiley & Sons, 1985.

⁴ Garcia Ruano, J. L.; Fajardo, C.; Fraile, A.; Martın, M. R.; J. Org. Chem., 70, 4300-4306, 2005.