Estudo conformacional e das interações eletrônicas de algumas a-fenilseleno-a-dietóxfosforilacetofenonas-*para*-substituídas.

Celso Moreira¹ (PG), Paulo Roberto Olivato¹ (PQ)*, Alessandro Rodrigues¹ (PQ), Thiago Carita Correra¹(IC), Nelson Luís Campos Domingues¹ (PG), Maurizio Dal Colle² (PQ)

¹ Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, e-mail: prolivat@iq.usp.br ²Dipartimento di Chimica, Università di Ferrara, Ferrara, Itália.

Palavras Chave: análise conformacional, espectroscopia infravermelho, cálculos *ab initio*.

Introdução

O presente trabalho é uma extensão lógica do estudo das a-metilio-a-dietóxfosforilacetofenonas¹ e trata do estudo conformacional das a-fenilseleno-a-dietóxfosforilacetofenonas-*para*-substituídas (**1-6**, Fig. 1), através da espectroscopia do infravermelho e cálculos *ab initio*, com a finalidade de investigar como a variação da densidade eletrônica do oxigênio carbonílico afeta a estabilidade relativa dos conformeros mais estáveis.

Figura 1: Compostos estudados

Resultados e Discussão

A análise das bandas de estiramento da carbonila (ν_{CO}) no IV, deconvoluídas, em solventes de polaridade crescente (CCl₄, CHCl₃, CH₂Cl₂ e CH₃CN), na transição fundamental e na região do primeiro harmônico (em CCl₄) revelou a existência de um tripleto de intensidades relativas aproximadamente constantes (em CCl₄, CHCl₃ e CH₂Cl₂). Já no solvente mais polar CH₃CN constata-se a presença de um dubleto, com o simultâneo desaparecimento do componente de mais baixa frequência do tripleto. O efeito do solvente sobre a intensidade relativa dos componentes da banda de ν_{CO} não é uma evidência da existência do equilíbrio conformacional, porém, a constatação de três bandas na região do primeiro harmônico, em CCl₄, cujas frequências são ca. de duas vezes às da transição fundamental e com intensidades relativas aproximadamente iguais as da transição fundamental, sugere a existência de três conformações (I, II, III) (Fig. 2), sendo a conformação (II) a mais estável. O efeito do solvente no tripleto sobreposto sugere que a banda de menor frequência corresponde à conformação (III) menos polar, onde o dipolo da carbonila encontra-se em oposição aos dipolos a-C-Se e a-C-P. Pode-se atribuir ao 29^o Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

componente de frequência mais alta a conformação (I) onde existe um efeito de Campo Repulsivo entre os dipolos C-Se e C=O. A conformação (II) é a mais estável decorrente do efeito sinérgico da interação hiperconjugativa entre os orbitais p^*_{CO}/s_{C-Se} e p^*_{CO}/n_{Se} , que aumenta a densidade de carga do oxigênio carbonílico e que por sua vez a transfere para o fósforo positivamente carregado do grupo fosforila $O^{\delta-}CO \dots P^{\delta+}_{PO}$ (Fig. 2).

Figura 2: Conformações dos compostos estudados.

O cálculo *ab initio* HF/6-31G** para **3** indica que a conformação mais estável (II) (c~60%), de frequência intermediária apresenta o grupo Seφ na geometria *sin-clinal* (*gauche*) e o grupo [P(O)(OEt)₂] na geometria *quasi-periplanar* (*quasi-cis*) em relação a carbonila. Já o conformero de mais alta frequência corresponde a conformação (I) e a conformação de mais baixa frequência corresponde a conformação (III) menos estável (III)

Conclusões

A espectroscopia no IV aliada aos cálculos *ab initio* indicou a existência de três conformeros, onde a conformação (II) a mais estável (c ~ 60%) apresenta o grupo Seφ na geometria *sin-clinal* (*gauche*) e o grupo [P(O)(OEt)₂] na geometria *quasi-periplanar* (*quasi-cis*) em relação a carbonila.

Agradecimentos

CNPq, FAPESP e CAPES

¹ A.K.C.A. Reis, Tese de Doutorado, Instituto de Química, USP (2003).