Constituintes voláteis do óleo essencial da *Egletes viscosa* em diferentes estágios ontogenéticos e avaliação da atividade antimicrobiana

Francisco Artur e Silva Filho¹ (PG), Mary Anne Sousa Lima¹ (PQ), Edilberto Rocha Silveira^{*1} (PQ), Vânia Maria Maciel Melo² (PQ). edil@ufc.br

1. Curso de Pós-Graduação em Química Orgânica, Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, 2. Depto. de Biologia, Universidade Federal do Ceará.

Palavras Chave: *Egletes viscosa*, óleos essenciais, atividade antimicrobiana

Introdução

Estudos preliminares sobre a constituição química volátil das inflorescências de *Egletes viscosa* Less (Asteraceae) permitiu a identificação de dois diferentes quimiotipos para a espécie¹. O quimiotipo A foi caracterizado pela presença de acetato de *trans*-pinocarveila como constituinte principal do óleo, e o quimiotipo B pelo acetato de *cis*-isopinocarveila². O presente trabalho relata o estudo dos constituintes químicos voláteis e a atividade antimicrobiana do óleo essencial da *E. viscosa* quimiotipo B em diferentes estágios ontogenéticos.

Resultados e Discussão

Egletes viscosa B, foi coletada no município de Chorozinho-Ce no estágio vegetativo em agosto de 2004, e durante a floração em dezembro de 2004. A planta inteira foi submetida a um processo de hidrodestilação para cada caso, levando a obtenção dos óleos denominados de OEEVB1 (0,02%) (estágio vegetativo) e OEEVB2 (0,08%) (durante a floração). Análise por CG/EM e CG/DIC de ambos os óleos revelou diferenças na composição química dos constituintes majoritários. O óleo OEEVB1 apresentou como constituinte majoritário um diterpeno (1) (32,8 %) e o γ -eudesmol (2) (20,35%); enquanto que OEEVB2 foi constituído principalmente de uma mistura de um monoterpene (3) (43,2%) e um álcool poliinsaturado saturado na forma acetilada (4) (16,1%). OEEVB1 foi cromatografado em coluna de gel de sílica, levando ao isolamento de um composto caracterizado como sendo o diterpeno furânico (1). Cromatografia de EVB-2 seguindo o mesmo procedimento permitiu o isolamento do acetoxi dec-2*E*-en-4,6-diino (4) e do monoterpene acetato de isopinocarveila β (Fig.1). As estruturas isoladas foram elucidadas através do uso de técnicas espectrométricas utilizando ressonância magnética nuclear (uni e bidimensionais) e espectrometria de massa.

Ambos os óleos foram submetidos à avaliação da atividade antimicrobiana, utilizando o método de Bauer pela inibição do crescimento bacteriano cultivado em

Muller Hinton por 18 horas. Os resultados mostraram que OEEVB1 apresentou uma zona de inibição de 10,5 mm para *Staphylococcus aureus* e de 10,0 mm para *Chromobacterium violaceum*, O OEEVB2 apresentou uma zona de inibição de 15,5 mm para a *Staphylococcus aureus*.

Figura 1. Constituintes majoritários dos óleos essenciais de *E. viscosa* quimiotipo B

Conclusões

E. viscosa quimiotipo B apresentou diferenças na composição química nos constituintes majoritários dos óleos essenciais, através do estudo comparativo dos diferentes estágios ontogenéticos da planta. Os constituintes majoritários 1, 3 e 4 são inéditos na literatura. A avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais revelou uma atividade compatível com a do antibiótico de controle (Vancomycin) para OEEVB2.

Agradecimentos

CNPq, CAPES FUNCAP e PRONEX pelo apoio financeiro.

^{1,2}CUNHA, A. N.; Tese de Doutorado (Doutorado em química orgânica) Universidade federal do Ceará, Fortaleza-ce, 2003.

Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

³SOUZA, M.F.; RAO, V.S.N.; SILVEIRA, E.R.. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, Ribeirão Preto, v.25, n.10, p.1029-1032, 1992.