Alcalóides das folhas de *Gutteriopsis friesiana* (Annonaceae)

Emmanoel V. Costa¹, (PG), Beatriz Helena L. N. Sales Maia^{1,*} (PQ), Francisco de A. Marques¹ (PQ), Maria Lúcia B. Pinheiro² (PQ). *noronha@ufpr.br

¹Departamento de Química/UFPR, ²Departamento de Química/UFAM

Palavras Chave: Annonaceae, *Gutteriopsis friesiana*; alcalóides.

Introdução

Em continuação ao estudo químico e biológico de *Gutteriopsis*, o presente trabalho descreve o isolamento de alcalóides das folhas de *Gutteriopsis friesiana* W.A.Rodrigues. Esta espécie é conhecida popularmente como envreira e distribui-se na Amazônia brasileira.^[1] Estudos prévios desta espécie relatam o isolamento de esteróides e lactonas sesquiterpênicas, bem como a determinação da atividade antitumoral *in vitro* dos seus extratos.^[2] Visando contribuir com o conhecimento das potencialidades florestais brasileiras apresentamos neste, os resultados do estudo fitoquímico biomonitorado dos extratos e frações das folhas frente ao teste de toxicidade sobre *Artemia salina*.

Resultados e Discussão

As folhas de *G. friesiana* foram trituradas e extraídas a frio com hexano e MeOH. Os extratos foram submetidos aos ensaios biológicos, sendo que o extrato metanólico (EM) apresentou atividade citotóxica frente ao teste de toxicidade sobre *Artemia salina* com IC₅₀ = 64,54 µg/mL. A análise por CCD deste extrato evidenciou a presença de alcalóides, sendo então submetido ao tratamento ácido-base convencional, obtendo-se duas frações EMN e EMA, que foram novamente submetidas ao teste de atividade sobre *Artemia salina*. Novamente EMA contendo os alcalóides foi o mais ativo. EMA foi então submetido a diversas CC utilizando sílica gel previamente tratada com solução NaHCO₃ 10% e CCDP obtendo-se quatro compostos: EMA-1, EMA-2, EMA-3 e EMA-4, os quais apresentaram teste positivo para alcalóides frente ao reagente de Dragendorff. O composto EMA-2 apresentou-se como um sólido amarelo-alaranjado em forma de agulhas quando recristalizado em CHCl₃:MeOH 2:1. Foi identificado como uma mistura alcaloidal contendo três alcalóides oxoaporfínicos: liriodenina (**1A**), lysicamina (**1B**) e atherospermidina (**1C**), sendo 1A a substância majoritária na mistura. O composto EMA-3 (**2**) apresentou-se como um sólido amarelado em forma de agulhas quando recristalizado em CHCl₃ e p.f. 187-188°C, e identificado como o alcalóide protoberberínico 7,8-diidro-8-hidroxi-palmatina isolado previamente de *Enantia chlorantha* (Annonaceae).^[3] O

composto EMA-4 (**3**) apresentou-se como um sólido amarelado em forma de agulhas quando recristalizado em CHCl₃:MeOH 2:1 e p.f. 206-207°C, e identificado como o alcalóide protoberberínico palmatina. O composto EMA-1 encontra-se em fase de determinação estrutural. A análise prévia de seus dados aponta para um alcalóide do tipo aporfino 7-substituído. Os compostos isolados foram identificados baseados nos seus dados espectroscópicos e espectrométricos, e comparações com dados da literatura.

Conclusões

Embora a família seja caracterizada em sua maioria pela presença dos alcalóides aporfínicos, observamos que os constituintes majoritários presentes nas folhas de *G. friesiana* pertencem à classe dos alcalóides protoberberínicos, comuns no gênero *Enantia*, sendo de grande importância o seu isolamento para a quimiotaxonomia da família.

Agradecimentos

CNPq e CAPES pelo apoio financeiro. Dr. A. Barison (UFPR) pela aquisição dos dados de RMN.

¹ Ribeiro et al. 1999. *Flora da Reserva Ducke Guia de Identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central*. 816 p.

² <https://sec.sbq.org.br/cd29ra/resumos/T0254-2.pdf>.

³ Wafo, P.; Nyasse, B.; Fontaine, C. 1999. *Phytochemistry* 50:279-281.