Estudo comparativo de metalofalocianinas imobilizadas em matrizes sólidas como catalisadores na degradação do ácido cloranílico.

Heide R. Airoidi (IC)*¹, Anderson O. Ribeiro (PQ)², Yassuko Iamamoto (PQ)¹

* heideairoidi@aluno.ffclrp.usp.br

¹Departamento de Química da FFCLRP/USP, Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14049-901, Ribeirão Preto, SP.

²Centro de Ciências Naturais e Humanas – UFABC, Rua Santa Adélia, 166, Santo André, SP.

Palavras Chave: metalofalocianinas, ácido cloranílico, degradação.

Introdução

O ácido cloranílico é um dos produtos da degradação oxidativa do pentaclorofenol (PCP) e considerado um composto modelo nos estudos de degradação de organoclorados. Neste trabalho foram realizados estudos catalíticos da degradação do ácido cloranílico em solução aquosa utilizando como catalisadores heterogêneos diferentes metalofalocianinas suportadas em matrizes sólidas, utilizando H₂O₂ como oxidante. Estudos preliminares foram relatados anteriormente¹ utilizando o sistema ferro(III)tetrassulfonatoftalocianina suportado em sílica funcionalizada (FePcSO₃⁻SiN⁺)/H₂O₂ para a degradação do ácido cloranílico. Neste trabalho, além do complemento deste estudo, foi empregado no estudo a cobre(II)-hexadecafluorofalocianina (CuPcF₁₆) substituída por reação com aminopropiltrióxissilano (APTES).

Resultados e Discussão

As degradações foram realizadas com uma relação² catalisador:oxidante:substrato de 1:500:50. A degradação utilizando a FePcSO₃⁻SiN⁺ foi acompanhada tanto no ultravioleta como na região do visível. A Figura 1 apresenta os espectros de acompanhamento das bandas características do ácido cloranílico em 214 nm e 322 nm. Percebe-se que a diminuição destas bandas no UV tem início a partir do segundo dia de reação (24h). A degradação total se dá depois de 72 horas de reação.

Figura 1: a) Espectro UV-Vis da degradação do ácido cloranílico, usando FePcSO₃⁻SiN⁺/H₂O₂. b) Ferro(III)tetrassulfonatoftalocianina.

Ferro(III)tetrassulfonatoftalocianina.

Após a reação observou-se um descolorimento do catalisador (FePcSO₃⁻SiN⁺), havendo uma possível degradação.

Foi sintetizado o catalisador CuPcF₁₆-APTES com CuPcF₁₆ e APTES numa relação de 1:16, na presença de THF sob atmosfera de N₂. Observou-se a formação de sólido em menos de 1h. Isto indica que ao invés de ocorrer a substituição eletrofílica como esperado, possivelmente ocorreu uma hidrólise com consequente formação de clusters que propiciaram uma imobilização eficiente da CuPcF₁₆.

Figura 2: a) Espectro UV-Vis da degradação do ácido cloranílico, utilizando CuPcF₁₆-APTES/H₂O₂. b) Cobre(II) hexadecafluorofalocianina.

O sistema CuPcF₁₆-APTES/H₂O₂ quando comparado ao anterior mostra-se mais eficiente na degradação do ácido cloranílico, pois o substrato está quase degradado com aproximadamente 11 h de reação (Figura 2). Já no sistema FePcSO₃⁻SiN⁺/H₂O₂ a degradação ocorre depois de 72 horas de reação. Além disso, ao final da catálise, o catalisador CuPcF₁₆-APTES aparentemente não sofreu nenhuma degradação.

O alto potencial de degradação do catalisador pode ser devido a possível formação de cluster de APTES onde a CuPcF₁₆ está imobilizada.

Conclusões

Os experimentos de catálise utilizando o sistema FePcSO₃⁻SiN⁺/H₂O₂ em meio ácido não foram adequados para degradação do ácido cloranílico. Já o sistema CuPcF₁₆-APTES/H₂O₂ mostrou uma melhor eficiência na degradação. O maior potencial de degradação deste catalisador pode ser devido a dois fatores: a) presença do substituinte eletrofílico e b) à natureza da interação Cu-ftalocianina com a matriz sólida.

Agradecimentos

FAPESP, CNPq, CAPES

¹ Airoidi, H. R.; Monsales, M. S.; Costa, C. R. e Iamamoto, Y.; 29ª RA da SBQ, QI-039, (2006).

Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

² C. R. Costa, **Degradação Oxidativa de Contaminantes Organoclorados**. Dissertação de Mestrado apresentada a FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP, 2005.