Derivados de antraquinonas produzidas pelo fungo endofítico *Pestalotiopsis guepinii* associado às folhas de *Virola michelii*

Oliveira, M.N. ¹(PG), Lopes Júnior, M.L. ¹(IC), Ferreira, I.C.S. ¹(IC), Nascimento, M.N. ¹(PQ), Arruda, M.S.P. ¹(PQ), Guilhon, G.M.S.P. ¹(PQ), Muller, A.H. ¹(PQ), Santos, A.S. ¹(PQ), Rodrigues Filho, E. ²(PQ), Oliveira, M.C.F. ³(PQ) e Santos, L.S. ^{*1}(PQ). *Iss@ufpa.br*

¹Curso de Pós-Graduação em Química-CCEN-Universidade Federal do Pará-CEP 66970-110, ²Universidade Federal de São Carlos-São Carlos-SP, ³Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza-CE.

Palavras Chave: *Pestalotiopsis guepinii*, antraquinonas, fungo endofítico, *Virola michelii*

Introdução

Uma parcela dos microorganismos, em especial fungos, habita o interior das plantas. São os chamados fungos endofíticos¹ (Petrini, 1991), que colonizam os tecidos saudáveis das plantas, em algum tempo do seu ciclo de vida, sem lhes causar danos aparentes.

Os endófitos são potencialmente úteis na agricultura e na indústria, podendo ser ainda utilizados como vetores para introdução de genes de interesse nas plantas², como agentes inibidores de pragas e patógenos³ e como fonte de metabólitos primários e secundários de interesse.

O estudo dessas interações entre plantas e microorganismos, além de contribuir grandemente para o entendimento de muitos processos químicos na natureza e da ecologia, pode resultar no estabelecimento de fontes alternativas de substâncias de interesse para a humanidade.

Neste contexto, o estudo químico da biomassa produzida por *P. guepinii* isolado das folhas de *V. michelii* vem contribuir na busca de substâncias novas, assim como para o conhecimento da diversidade dos microorganismos da Amazônia.

Com o objetivo de caracterizar a biomassa produzida pelo endófito, as partições hexânica e diclorometânica do extrato metanólico-1 foram submetidas a métodos cromatográficos com o consequente isolamento das substâncias cloroisossulocrina e um novo derivado de antraquinona.

Resultados e Discussão

O fungo *P. guepinii* foi cultivado em arroz e incubado por um período de 30 dias. Após o período de incubação o sistema foi tratado com metanol levando à obtenção do extrato metanólico-1 que foi particionado com hexano, diclorometano e acetato de etila. A fase hexânica foi submetida à cromatografia clássica e a fração hex/ AcOEt 20% foi submetida a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) levando ao isolamento de um novo derivado de antraquinona (**S1**). O isolamento se deu em uma coluna synergi fusion C18 4 μ (250 mm x 10 mm) da phenomenex, com um sistema isocrático composto por H₂O:MeCN 40:60 a um fluxo de 4,7 mL/min e comprimento de onda de 215 nm.

A fase diclorometânica também foi fracionada por CCVU. As frações Hex/ AcOEt 40% e Hex/ AcOEt 60% foram reunidas e por CLAE se deu o isolamento da substância cloroisossulocrina (**S2**), utilizando-se um sistema ternário H₂O:MeOH:MeCN 55:25:20 e as demais condições foram mantidas. Ambas as substâncias foram identificadas utilizando as técnicas uni e bidimensionais de RMN ¹H e ¹³C.

Conclusões

Neste trabalho foram isoladas duas metabólitos derivados de antraquinona, sendo **S1** uma substância inédita

Agradecimentos

Ao Curso de Pós-Graduação em Química da UFPA. Ao PIBIC/CNPq pelas bolsas de IC. À CAPES/ PROCAD pela bolsa de Doutorado e apoio financeiro. Ao FUNTEC/SECTAM-PA pelo apoio financeiro.

¹ PETRINI, O. Fungal endophyte of three leaves. 1991. In: ANDREWS, J.; HIRANO, S.S (Eds). *Microbial Ecology of leaves*. New York. Springer Verlag. P. 179-197.

² FAHEY, J.W. Endophytic Bacteria for the delivery of agrochemicals to plants. 1988. In: CUTLER, H.O. (Ed.) *Biologically active natural products. Potential use in agriculture*. American Chemical Society Symposium Ser. Washington. P. 120-128.

³ VOLKSCH, B.; ULLRICH, M.; FRYTSCH, W. Identification and population dynamics of bacteria in leaf spots of soybean. *Microbial Ecology*. **24**, 305-311 (1992).