Síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de um novo complexo binuclear de Fe(III)Cd(II) como modelo para as PAPs

Fernando R. Xavier(PG)*, Rosely A. Peralta (PQ), Adailton J. Bortoluzzi (PQ) e Ademir Neves (PQ)

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Química, Laboratório de Bioinorgânica e Cristalografia – 88040-900, Florianópolis – SC, Brasil. *xavier@qmc.ufsc.br

Palavras Chave: Bioinorgânica, complexos modelo, PAPs.

Introdução

As fosfatases ácidas púrpuras (PAPs) são metaloenzimas binucleares que apresentam sítios ativos com configuração $M^II Fe^III$ (onde M^II pode ser Fe, Mn ou Zn). Essas enzimas são capazes de catalisar a hidrólise de ésteres e anidridos do ácido fosfórico dentro de uma faixa de pH de 4 a 7.^[1] Embora ambos os metais pareçam essenciais durante o processo catalítico, seus papéis individuais não são, até o presente momento, totalmente esclarecidos. Neste sentido, diversos estudos envolvendo a substituição do Fe^III por Al, Ga, In e M^I por Co, Cu, Cd, Hg têm sido reportados na literatura.^[2,3] Neste trabalho é reportada a síntese, caracterização estrutural preliminar por difratometria de raios-X e estudos espectroscópicos do complexo $[Cd^II Fe^III(bpbpmp)(\mu-OAc)_2]ClO_4 \cdot H_2O$ (**1**) como análogo sintético para as PAPs metalo-substituídas.

Resultados e Discussão

O complexo **1** foi sintetizado adicionando-se à uma solução metanólica de 0,5 mmol de ligante $H_2BPBPMP$ ^[4] 0,5 mmol de $Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ onde em seguida foi gotejado lentamente uma solução metanólica de $Fe^III(ClO_4)_3 \cdot 9H_2O$ (0,5 mmol) e acetato de sódio (1 mmol), resultando em uma solução púrpura intensa. A recristalização de **1**, em metanol possibilitou a obtenção de monocristais púrpura adequados à análise por difratometria de raios X (Figura 1).

Figura 1. Configuração estrutural de **1**.

De acordo com o pré-refinamento dos dados cristalográficos, constatou-se que **1** cristaliza sob um sistema monoclinico com grupo espacial $P2_1/n$. As dimensões (Å) da cela unitária são: $a = 15,283$; $b = 12,591$; $c = 20,849$ com $\beta = 90,32^\circ$; $V = 4012,0 \text{ \AA}^3$. Os dois centros metálicos ($Fe^III Cd^II$) estão ponteados pelo oxigênio fenólico (O10) proveniente do ligante e por dois acetatos exógenos. A esfera de coordenação do centro Fe1 é completada por dois nitrogênios, N1 e N32, e por um oxigênio do grupo fenolato terminal O20. O ambiente de coordenação do centro Cd1 é completado pelos nitrogênios N4, N42 e N52. O espectro eletrônico de **1** apresenta duas bandas de absorção, sendo uma centrada em 533nm ($\epsilon = 3078 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$) atribuída a um processo de TCLM proveniente dos orbitais $p\pi_{\text{fenolato}} \rightarrow d\pi^*$ do íon Fe^III , e um segundo processo de TCLM ocorre 332nm ($\epsilon = 4113 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$), envolvendo os orbitais $p\pi_{\text{fenolato}} \rightarrow d\sigma^*$ do íon Fe^III .^[3] A espectroscopia na região do infravermelho (KBr) apresenta as seguintes bandas : 1607, 1559, 1478, 1420, $[V_{(C=C)ph}, V_{(C=N)py}, V_{(C-O)acetato}]$; 1291, 1260 $[V_{(C-O)ph}]$; 1092 $[V_{(Cl-O) ClO_4}]$. Estudos de eletroquímicos de **1** a temperatura ambiente em uma solução de CH_3CN contendo 0,1 mol.L⁻¹ de TBAPF₆ como eletrólito de suporte sob atmosfera de argônio apresentou um processo *quasi*-reversível relativo ao par redox $Fe^{III/II}$ em $-0,47 \text{ V vs. ENH}$. Em comparação com seu análogo estrutural $Fe^III Zn^II$ ^[4] ($-0,51 \text{ V vs. ENH}$), **1** apresentou-se anodicamente deslocado.

Conclusões

Um novo complexo heterobinuclear $Fe^III Cd^II$ foi sintetizado, caracterizado via cristalografia e espectroscopicamente e, apresentou analogia estrutural a complexos já estudados^[2,4]; **1** apresenta-se promissor como modelo para as PAPs metalo-substituídas.

Agradecimentos

CNPq e DQ-UFSC

^[1] Schenk, G.; et al. *PNAS*. **2005**, 102, nº 2, 273-278.

^[2] (a) Merckx, M.; Averill, B. *Biochemistry*. **1998**, 37 8490. (b) Twichett, M. B.; et al. *Inorg. Chem.* **2002**, 41, 5787.

^[3] Xavier, F. R.; Dissertação de Mestrado, UFSC, **2006**.

^[4] Lanznaster, M.; et. al. *Inorg. Chem.* **2002**, 41, 5641.