Interação de corantes catiônicos com um filossilicato em solução aquosa.

Márcia M. F. Silva¹ (PG), Michelle M. de Oliveira¹ (PG), Kátia B. Machado¹ (IC), Maria Gardênnia da Fonseca^{1*} (PQ), Luiza N. H. Arakaki¹(PQ).

¹Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Química, João Pessoa, Paraíba .
*mgardennia@quimica.ufpb.br

Palavras Chave: *filossilicato, argilomineral, corantes.*

Introdução

Os corantes catiônicos interagem com alguns filossilicatos através de reações de troca iônica. Além das forças eletrostáticas, o processo de adsorção pode ser acelerado pela formação de agregados moleculares. Esses sistemas tem interesse em processos de separação envolvendo águas residuais resultantes de indústrias têxteis e em eletroquímica. Nesse trabalho vermiculitas nas formas sódica, cúprica e cobáltica foram utilizadas para interação com azul de metileno. Na obtenção das isotermas de adsorção amostras de 100 mg de cada sólido foram suspensas em 20,0 cm³ de soluções aquosas do corante em concentrações entre 10 a 200 ppm, sendo mecanicamente agitadas a 298 K por 48 horas. A quantidade de corante nas soluções remanescentes foi quantificada por espectroscopia de absorção na região do UV-VIS a 520 nm.

Resultados e Discussão

Todos os sólidos contendo corantes apresentaram coloração azul intensa e persistente mesmo após 72 horas de lavagens, sugerindo que um processo de imobilização química e não apenas de adsorção física. Os dados de CHN referentes a interação do corante com a vermiculita sódica estão apresentados na tabela 1. Observa-se que a quantidade de corante imobilizada foi 0,32 mmol g⁻¹ quando se partiu de solução de cada corante a 100,0 ppm.

Tabela 1. Análise elementar de CHN de vermiculita sódica com azul de metileno (V/AMet).

Sólido	C / %	H / %	N / %
V/AMet	1,00	1,15	0,44

As isotermas de interação são apresentadas na Fig. 1. As amostras com os corantes imobilizados foram submetidas a difratometria de Raios-X cujos dados para a vermiculita sódica estão apresentados na Fig. 2. Conforme se observa não houve alteração significativa no espaçamento basal dos sólidos obtidos com relação à vermiculita precursora,

sugerindo que a imobilização apenas na superfície do sólido. Um comportamento semelhante foi observado para os demais sólidos.

Figura 1. Isotermas de interação do azul de metileno em vermiculitas em solução aquosa a 298 K.

Figura 2. Dados de DRX da vermiculita sódica (a) e após sua interação com os corantes azul de metileno (b).

Conclusões

A imobilização de corantes em vermiculita sódica foi mais efetiva do que nos outros dois sólidos investigados. Os processos interativos entre filossilicatos e corantes orgânicos envolvem reações de natureza complexa tanto do ponto de vista da forma do corante como da superfície necessitando de determinações mais específicas para serem compreendidas.

Agradecimentos

Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

CAPES e CNPq pelo apoio financeiro.