Modelagem Cinética da Oxidação do Fenol pela Reação de Fenton. Importância das Reações Envolvendo o Ciclo Redox do Ferro

Leidi Cecília Friedrich^{*1} (PG), Maria Anita Mendes¹ (PQ), Carolina Vautier-Giongo^{1,2} (PQ), Frank H. Quina¹ (PQ).

*leidi@iq.usp.br

¹ Instituto de Química, Universidade de São Paulo, CP 26077, 05513-970 São Paulo e CEPEMA-USP, Cubatão, SP

² Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema, Diadema-SP.

Palavras Chave: Reação de Fenton, modelagem cinética

Introdução

Os dois principais e bem estabelecidos grupos de reações identificados em processos de oxidação de compostos orgânicos pela reação de Fenton (Fe(II) e H₂O₂) são: (i) o das reações envolvendo espécies reativas de oxigênio (OH[•], H₂O₂, HO₂[•], ou O₂^{•-}) e íons Fe(II) e Fe(III) e (ii) o das reações entre os substratos orgânicos e as espécies reativas de oxigênio. Um terceiro grupo de reações, bem menos estudado, mas de extrema importância em processos que empregam a reação de Fenton para degradar poluentes orgânicos trata de reações entre íons ferro e intermediários orgânicos que influenciam o ciclo redox do ferro. No caso da decomposição do fenol pela reação de Fenton, a ocorrência de regeneração de Fe(II) é conhecida.¹

Neste trabalho é proposto um modelo cinético constituído apenas pelas reações elementares mais relevantes, incluindo aquelas envolvendo o ciclo redox do ferro, para descrever a degradação do fenol pela reação de Fenton.

Resultados e Discussão

A degradação de 12 mM de fenol presente numa solução aquosa foi realizada a 30 °C, com pH inicial ajustado em 3, empregando 200 mM de H₂O₂ e 0,5 mM de Fe(II). O H₂O₂ foi adicionado a 1 mL/min, durante os 72 primeiros minutos de reação. Amostras retiradas em intervalos de tempo regulares foram analisadas por HPLC-MS (Shimadzu).

A Tabela I apresenta o modelo cinético proposto. As equações diferenciais de variação de concentração das espécies em função do tempo para cada reação elementar foram resolvidas por técnicas de integração numérica, empregando o software GEPASI 3.3.² A Figura 1 mostra a razoável correlação entre os resultados da modelagem e os obtidos experimentalmente. As reações envolvendo a redução do Fe(III) pelos radicais di- e tri- hidroxíciclo-hexadienila são indispensáveis tanto ao processo de modelagem quanto ao entendimento do elevado teor de fenol degradado, considerando a estequiometria do

processo. Os resultados ressaltam a importância da regeneração do Fe(II) na degradação de compostos orgânicos que envolvam intermediários radiculares capazes de reduzir Fe(III).

Tabela I: Modelo cinético para oxidação do fenol

Reação	k (s ⁻¹ ou M ⁻¹ s ⁻¹)
1 Fe ²⁺ + H ₂ O ₂ ? Fe(III) + HO [•] + HO [•]	$k_1 = 70$
2 Fe(III) + H ₂ O ₂ ? Fe ²⁺ + HO ₂ [•] + H ⁺	$k_2 = 0.01$
3 fenol + HO [•] ? <i>o</i> -DHCR ^b	^a $k_3 = 2 \times 10^{10}$
4 fenol + HO [•] ? <i>p</i> -DHCR ^b	^a $k_4 = 6 \times 10^9$
5 <i>o</i> -DHCR ^a + Fe ³⁺ ? cat ^d + Fe ²⁺	^c $k_5 = 7000$
6 <i>p</i> -DHCR ^a + Fe ³⁺ ? hq ^e + Fe ²⁺	^c $k_6 = 7000$
7 cat + HO [•] ? THCD ^g	^f $k_7 = 1,4 \times 10^{10}$
8 hq + HO [•] ? THCD ^g	^f $k_8 = 4,0 \times 10^9$
9 THCD ^g + Fe ³⁺ ? Fe ²⁺ + THB ^h	^c $k_9 = 7000$

^aLiteratura: $k \sim 1 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$; ^b*o*-DHCR^a e *p*-DHCR^a = radicais *orto*- e *para*-dihidroxíciclo-hexadienila; ^cLiteratura: $k = 7000 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$; ^dcat = catecol; ^ehq = hidroquinona; ^fLiteratura: $k = 7 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$; ^gTHCD^g = radical trihidroxihexadienila; ^hTHB = trihidroxibenzeno

Figura 1. Comparação entre resultados experimentais e os da modelagem cinética para a degradação do fenol pela reação de Fenton.

Conclusões

O modelo cinético adequa-se razoavelmente bem à descrição da decomposição do fenol pela reação de Fenton, bem como da geração e decaimento dos dihidroxibenzenos intermediários neste processo, destacando a importância da regeneração do Fe(II) na degradação do fenol.

Agradecimentos

CAPES, CNPq, FAPESP e Fundação ALCOA.

- [1] Chen, R., Pignatello, J. *Environ. Si. Technol.* 1997, **31**, 2399.
[2] Mendes, P., 1993. *Comp. Appl. Biosci.* 1993, **9**, 563–571.