Síntese e Estudo Conformacional da 3-feniltio-1-metil-2-piperidinona

Carlos Rogério Cerqueira Júnior¹ (IC)*, Paulo Roberto Olivato¹ (PQ)*, Elisângela Vinhato¹ (PG)

¹Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, *e-mail: crcerq@iq.usp.br ou prolivat@iq.usp.br

Palavras Chave: análise conformacional, cálculos teóricos, infravermelho, delta-valerolactamas

Introdução

A análise conformacional da 3-feniltio-1-metil-2-piperidinona (**Figura 1**), por meio da espectroscopia no infravermelho e cálculos teóricos, tem como objetivo determinar quais são as conformações mais estáveis do referido composto em solventes de diferentes polaridades.

Figura 1. 3-feniltio-1-metil-2-piperidinona.

Tal metodologia serve de ponto de partida para um estudo mais abrangente, o qual leva em consideração diferentes estados de oxidação do átomo de enxofre e a influência de substituintes doadores e atraentes de elétrons no equilíbrio conformacional.

Resultados e Discussão

Partindo-se da δ -valerolactama, foi realizada uma *N*-alquilação, para se obter a 1-metil-2-piperidinona. Em seguida, foi efetuada a sulfenilação desse composto, empregando-se LDA e difenildissulfeto¹. O produto foi purificado e foram adquiridos espectros de infravermelho em solventes de polaridade crescente (*n*-C₆H₁₄, CCl₄, CHCl₃, CH₂Cl₂, CH₃CN).

A deconvolução das bandas de estiramento da carbonila (ν CO), na transição fundamental e, em CCl₄, na região do primeiro harmônico (2 ν CO) revelou que há duas bandas em *n*-C₆H₁₄, CCl₄ e CH₂Cl₂, três bandas em CHCl₃ e apenas uma banda em CH₃CN.

Observou-se que em solventes de baixa constante dielétrica (*n*-C₆H₁₄ e CCl₄) o componente de maior frequência é majoritário. O aumento da polaridade do solvente provoca um aumento da proporção do componente de menor frequência (ν CO) em relação ao de maior frequência, até que em CH₃CN o componente de menor frequência torna-se preponderante.

Dados como energias relativas, momentos de dipolo e distâncias interatômicas foram obtidos por cálculos *ab initio* (HF/6-31G**) e DFT (B3LYP/6-31G**). As energias dos conformeros foram

calculadas em meios de diferentes constantes dielétricas, empregando-se o modelo de solvatação PCM (*polarizable continuum model*).

Os cálculos teóricos indicaram que a conformação adotada pelo anel lactâmico é de meia-cadeira, com a região amídica próxima da planaridade, de acordo com estudos anteriores². Observou-se que o átomo de enxofre fica numa posição *quasi-syn-clinal* (*q-sc*) em relação à carbonila e que a diferenciação entre os conformeros se dá principalmente pela posição do anel aromático em relação ao fragmento lactâmico.

Em *n*-C₆H₁₄, os conformeros mais estáveis são *q-sc1* e *q-sc2* (**Figura 2**), estabilizados pela atração eletrostática O_{CO}^{δ-}...H_(o-Ph)^{δ+}. Os cálculos teóricos comprovaram a influência do solvente no equilíbrio conformacional, indicando que a população relativa do conformero *q-sc3* (**Figura 2**), de maior momento dipolar, cresce de acordo com o aumento da polaridade do solvente.

Figura 2. Conformações mais estáveis.

Conclusões

Comprovou-se por cálculos teóricos e espectroscopia no infravermelho, o isomerismo conformacional da 3-feniltio-1-metil-2-piperidinona, influenciado pelo solvente. A atração eletrostática O_{CO}^{δ-}...H_(o-Ph)^{δ+} revelou-se um importante fator na estabilização dos conformeros.

Agradecimentos

CNPq, FAPESP, LCCA-USP

¹ Zoretic, P. A.; Soja, P. J. *Org. Chem.* **1976**, 41, 3587.

² Kuze, N.; Funahashi, H.; Ogawa, M.; Tajiri, H.; Ohta, Y.; Tsuyoshi, U.; Sakaizumi, T.; Ohashi, O. *J. Mol. Spectrosc.* **1999**, 198, 381.