Caracterizações Estruturais de Ligantes N,O-doadores de Interesse Biológico por Difração de Raios X e Modelagem Molecular

Elizabeth T. Souza (PG), Sérgio Nascimento Jr (PG), Lorenzo C. Visentin (PQ), Sérgio P. Machado (PQ) e Marciela Scarpellini¹ (PQ)

¹Instituto de Química, UFRJ, CEP 21949-909, Rio de Janeiro, RJ, marciela@iq.ufrj.br

Palavras Chave: ligantes, cristalografia, raios X, DFT, catalisadores.

Introdução

Moléculas contendo funções orgânicas similares àquelas apresentadas pelos resíduos de aminoácidos presentes nos sítios ativos de metaloenzimas têm sido amplamente empregadas em química bioinorgânica como ligantes¹.

Além do interesse em desenvolver novos complexos modelos estruturais e/ou funcionais para sistemas biologicamente importantes, estes ligantes também têm sido empregados na obtenção de catalisadores, metalodrogas e novos materiais.

A Teoria do Funcional de Densidade (DFT) têm tido sucesso na obtenção dos dados teóricos quando comparados aos resultados experimentais (estruturas cristalinas, espectros vibracionais e eletrônicos, entre outras).

Neste trabalho, buscamos correlacionar as propriedades eletrônicas dos ligantes L1 (4-nitro-2-[(2-piridin-2-il-etilimina)-metil]-fenol) e L2 (4-nitro-2-[(2-piridin-2-il-etilamina)-metil]-fenol) com suas caracterizações estruturais estudados por difração de raio X de monocristal e DFT.

Estes estudos visam elucidar as correlações estrutura/atividade em novos catalisadores para processos de branqueamento.

Resultados e Discussão

O ligante L1 foi sintetizado a partir de quantidades equimolares de 2(2-aminoetil)piridina e *p*-nitrosalicilaldeído em metanol, sob banho de gelo e agitação, durante 3 h. A redução de L1 com NaBH₄ no mesmo meio reacional levou à obtenção do ligante L2.² Monocristais adequados à resolução das estruturas cristalinas por difração de raios X de ambos L1 e L2 foram obtidos por recristalização em metanol.

Os cálculos utilizando DFT, através do uso do programa Spartan'06, com base híbrida B3LYP/6-31G^{*}, foram realizados em um PC Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz, com 2 Gb de memória RAM e 160 Gb de HD.

A figura 1 mostra as estruturas cristalinas dos ligantes L1 e L2. A principal diferença observada é nos comprimentos de ligação C1-N1 que são de 1,290(2) Å para L1 e 1,506(3) Å para L2. Estes valores encontram-se nas faixas observadas para ligações C=N e C-N, respectivamente, caracterizando

as funções imina e amina. Entretanto, a resolução cristalográfica do ligante L1 mostrou melhores resultados quando um átomo de hidrogênio foi incluído na posição idealizada ligado ao átomo de nitrogênio N1 e não ao oxigênio fenólico (O1). Ainda é possível observar uma distância de 1,969 Å entre este hidrogênio e o oxigênio O1, consistente com uma ligação de hidrogênio. Dessa forma, pode-se interpretar a molécula como apresentando uma carga parcial negativa em O1 e uma parcial positiva em N1.

Figura 1 – ORTEP dos ligantes L1 e L2.

Para a modelagem de L1 e L2 estabeleceu-se os átomos de nitrogênio como sp² e sp³, respectivamente. As geometrias otimizadas (figura 2) apresentaram erros menores do que 5% para L2, quando comparadas a resultados experimentais de difração de raios X. Porém, para L1, os erros foram mais significativos evidenciando o efeito observado na análise cristalográfica.

Figura 2 – Estrutura otimizada dos ligantes estudados.

Conclusões

Neste trabalho, foi possível caracterizar estruturalmente por difração de raios X dois ligantes de interesse bioinorgânico. Também foi possível a utilização do método DFT que se mostrou eficaz na otimização da geometria dos ligantes L1 e L2 quando correlacionados aos dados cristalográficos.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Capes, Faperj, PPGQI/IQ/UFRJ e LDRX-UFF.

¹ Scarpellini, M. *et. al. J. Chem. Soc., Dalton Trans.* **2001**, 18, 2616-2623.