BIOMONITORAMENTO DA ATIVIDADE TRIPANOCIDA FRENTE ÀS FORMAS AMASTIGOTAS DA CEPA Y DE *T. cruzi* EXTRATOS, PARTIÇÕES E FRAÇÕES OBTIDAS DE FOLHAS DE *Zanthoxylum naranjillo*

Eveline S. Costa(IC)^{1*}, Mychelli B. Sampaio(IC)¹, Thaís N. da C. Bianco(IC)¹, Karen C. de S. Rezende(IC)¹, Ademar A. da S. Filho(PQ)¹, Wilson R. Cunha(PQ)¹, Jairo K. Bastos(PQ)², Márcio L. A. Silva(PQ)¹

¹Núcleo de Pesquisa em Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade de Franca/Unifran; ²Laboratório de Farmacognosia do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP

E-mail: escostaqi2@yahoo.com.br

Palavras Chave: *Z. naranjillo*, amastigota, *T. cruzi*

Introdução

A diversidade do reino vegetal representa uma extraordinária reserva de novas moléculas, sendo que apenas uma pequena porcentagem das espécies vegetais existentes no mundo têm sido investigadas quimicamente e as triagens biológica e farmacológica de seus constituintes é ainda menor[1].

Resultados e Discussão

As amostras analisadas (Tabela 1) foram escolhidas devido aos bons resultados apresentados pela avaliação da atividade tripanocida que foi realizada por meio da verificação da porcentagem de lise das formas tripomastigotas do *Trypanosoma cruzi*

Tabela 1: Resultados da avaliação da atividade tripanocida, frente as formas amastigota da cepa Y de *Trypanosoma cruzi*.

Extratos, partições e frações	% de Lise ± EPM x Concentração em (µg/mL)			IC ₅₀ (µg/mL)
	2,0	8,0	32,0	
Extrato Bruto DCM	3,56 ± 1,14	17,35 ± 3,63	32,34 ± 5,33	84,19
	3,43 ± 0,12	13,32 ± 2,32	25,23 ± 3,43	
Extrato Bruto ETOH	22,53 ± 2,34	37,34 ± 3,53	52,34 ± 1,24	25,50
	1,35 ± 0,75	10,44 ± 2,32	22,36 ± 1,75	
Partição hexano E. B. DCM	2,32 ± 1,32	15,64 ± 3,23	40,00 ± 10,42	47,51
	1,35 ± 2,69	19,34 ± 1,51	42,21 ± 3,48	
Partição DCM E. B. ETOH	25,34 ± 2,32	35,64 ± 3,54	51,43 ± 4,45	29,35
	4,43 ± 0,95	29,35 ± 2,64	41,53 ± 7,64	
Partição AeOEt E. B. DCM	25,35 ± 1,45	36,45 ± 4,33	45,54 ± 3,34	52,55
	3,45 ± 1,35	22,45 ± 3,52	31,54 ± 2,44	
Partição butanol E. B. ETOH	13,57 ± 1,25	33,56 ± 3,23	45,23 ± 4,44	40,27

Tanto no E.B.DCM como na partição diclorometano do E.B.DCM há as presenças das lignanas (-)-cubebina (1), (-)-hinoquinina (2) e (-)-metilpluviatolido (3), que apresentam atividade biológica[2], por isso provavelmente esteja ocorrendo um efeito antagônico dentro dos mesmos, diminuindo assim, a atividade destas lignanas.

Partições como o hexano do E.B.DCM e diclorometano E.B.ETOH apresentaram resultados significativos, sendo que ainda não foram caracterizadas as causas desta atividade, necessitando de estudos mais detalhados. Sendo este um trabalho inédito, o mesmo mostra a importância do isolamento de novas substâncias e a avaliação de atividades biológicas, pois até o momento, esses extratos, partições e frações não haviam sido testados em atividade tripanocida.

Conclusões

Podemos evidenciar que são promissores os resultados obtidos até o momento bem como, a necessidade de ainda termos que realizar alguns ensaios complementares

Agradecimentos

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – Processo 98/14956-7, 01/12654, 01/12006-6, 05/01550-8 e 05/00464-0.

[1] - Cordell, G.A.; *Phytochemistry*. New York, v. 55, p.463-480, 2000

[2] - Bastos, J.K.; Albuquerque, S.; Silva, M.L.; *Planta Med.* 65, 541, 1999.