Avaliação das atividades antineoplásica e antiinflamatória de extratos das folhas de andiroba (*Carapa guianensis*)

Rafaela F. Camargo (IC)^{*1}, Júlio C. T. da Silva (PG)¹, Gilberto C. Franchi Jr. (PQ)¹, Alexandre E. Nowill (PQ)¹, Laryssa K. Rauh (PG)², Daniela Cabrini (PQ)² e Lauro E. S. Barata (PQ)¹.

1) Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, CP 6154, 13083-970, Campinas, SP, Brasil.

*g045973@iqm.unicamp.br

2) Universidade Federal do Paraná, UFPR, CP 19031, 81531-980, Curitiba, PR, Brasil.

Palavras Chave: *Carapa guianensis*, folhas de andiroba, antiinflamatório, antineoplásico.

Introdução

Popularmente conhecida como andiroba, a *Carapa guianensis* Aublet. é uma planta nativa da região Amazônica e apresenta uma larga aplicação na medicina popular, dentre as quais se destacam sua ação antiinflamatória, repelente, antitumoral e antimicrobiana, cujas propriedades farmacológicas são devido aos tetranortriterpenóides (limonóides) encontrados no óleo e sementes.^{1,2} Estudos recentes, realizados pelo nosso grupo de pesquisa, verificaram que tais substâncias também estão presentes nas folhas, porém com menor teor do que no óleo e sementes. Neste trabalho, objetiva-se testar a atividade antitumoral do extrato etanólico e antiinflamatória tópica dos extratos etanólicos, diclorometânico e hexânico das folhas.

Resultados e Discussão

As folhas foram secas, trituradas e extraídas por três processos distintos: a) etanol e diclorometano a t.a. (70g de folhas); b) hexano, diclorometano e etanol seqüencial em soxhlet (263 g de folhas); c) hexano, diclorometano e etanol seqüencial a t.a. (200 g de folhas). Cada um dos extratos teve sua ação antiinflamatória tópica avaliada pelo modelo de edema de orelha induzido pelo ácido araquidônico em camundongos Swiss.

Figura 1. Efeito dos extratos de *Carapa guianensis* no modelo de edema de orelha induzido pelo ácido araquidônico. Cada coluna representa a média $\pm$ E.P.M. de 4 a 6 animais. Os asteriscos demonstram o nível de significância quando comparado com o grupo controle (C). **p<0,01 e ***p<0,001.

O extrato etanólico a t.a. direto teve sua atividade antitumoral testada *in vitro* sobre células leucêmicas K562 e Nalm6, utilizando-se o teste colorimétrico de químo-sensibilidade MTT redutase em 48h. Os resultados de MTT redutase são considerados

positivos quando o grau de inibição é maior ou igual a 50%.³

Figura 2. Ensaio de MTT redutase com o extrato etanólico a t.a. direto e comparação com quimioterápicos comerciais utilizados no tratamento da leucemia (Aracytin® (Citarabina) e Gleevec).

A) Linhagens K562 (Leucemia mielóide crônica).
B) Linhagens Nalm6 (Leucemia linfóide aguda-B).

Os resultados sugerem que todos os extratos das folhas da *C. guianensis* possuem atividade antiinflamatória tópica nos processos inflamatórios agudos. Segundo o teste de MTT redutase, o extrato etanólico direto (t.a.) apresentou efeito antineoplásico, tendo boa seletividade entre as linhagens estudadas. A DL₅₀ para as células K562 foi de 90 μ g/mL e para NALM6 foi de 450 μ g/mL. Tais atividades são atribuídas possivelmente à presença dos limonóides, os quais estão sendo isolados e terão suas eficácias comprovadas.

Agradecimentos

CNPq, CIPQI, Laboratório de Dor, Febre e Inflamação – UFPR.

¹ Pereira, J. F.G. *Dissertação de Mestrado*. 1998, 262.

² Pereira, J.F.G.; Teixeira, D.F. e Gilbert, B. *Bulletino Chimico Farmaceutico*. 1999, 138, 177.

³ Oliveira, R. B.; Costa, E.A; Valadares, M. C., Cunha, L. C. *Revista Eletrônica de Farmácia*, 2005, 2, 137.