Padronização de metodologia para a avaliação de permeabilidade intestinal em ratos

Jacqueline Nakau Mendonça^{1*} (IC), Nilian Carla Silva Souza² (IC), Guilherme Vannucchi Portari² (TC), Paula Garcia Chiarello² (PQ), Alceu Afonso Jordão Júnior² (PQ).

1. Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Departamento de Química.
2. Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Departamento da Clínica Médica.

Palavras Chave: padronização, permeabilidade intestinal, manitol, lactulose.

Introdução

A verificação da permeabilidade intestinal vem sendo estudada com o objetivo de auxiliar na prevenção de doenças com cirrose, câncer de cólon, doença celíaca, pancreatite aguda, reações adversas a alimentos, entre outras. Estas doenças apresentam alterações na parede intestinal e consequentemente, mudanças na permeabilidade de nutrientes.

O epitélio intestinal é composto por dois tipos de poros que permite o transporte passivo de moléculas pequenas (monossacarídeos) e grandes (dissacarídeos) por caminhos transcelular e paracelular, respectivamente. Devido a este fato e sabendo que dependendo do estado da mucosa intestinal a absorção de moléculas será diferente, portanto o emprego do teste de permeabilidade intestinal utilizando dose oral de manitol e lactulose torna-se viável e de grande interesse na área clínica, uma vez que não proporciona danos ao organismo.

O teste de permeabilidade intestinal se fundamenta na administração oral de manitol e lactulose e posterior avaliação da concentração excretada, principalmente na urina, dos açúcares de interesse; e finalmente, a razão de lactulose/manitol obtida informará se a mucosa intestinal apresenta-se normal ou alterada¹.

O presente estudo tem o objetivo de padronizar a metodologia de permeabilidade intestinal por meio de análise de amostras biológicas (urina, fezes e soro) de ratos saudáveis, utilizando a técnica de cromatografia gasosa.

Resultados e Discussão

Para a padronização do método de permeabilidade intestinal utilizando cromatografia gasosa foi realizada a validação do método seguindo os parâmetros analíticos de seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez².

Os resultados foram obtidos utilizando a coluna capilar DB-1, que possibilitou a separação eficientes dos picos dos analitos de interesse inclusive com relação aos padrões interno mio-inositol e β -fenil-D-glucosídeo, fornecendo uma boa seletividade (figura 1).