Sesquiterpenos e diterpeno clerodânico do extrato hidroacetônico de folhas de *Hymenaea courbaril* var. *stilbocarpa* (Heyne) Lee & Lang.

Mariana P. de Campos Barbosa¹ (IC), Gabriel S. Giampietro¹ (IC), Elaine Monteiro Cardoso-Lopes¹ (PQ), Maria Cláudia M. Young¹(PQ), Vanderlan da Silva Bolzani²(PQ), Luce M. Brandão Torres¹(PQ).

¹ Instituto de Botânica - Avenida Miguel Estéfano, 3687, 04301-012, São Paulo-SP.

² Instituto de Química da UNESP/CP 355-14800-900, Araraquara São Paulo/SP- Brasil.

lmb@uol.com.br

Palavras Chave: *H. courbaril*, diterpeno clerodânico, sesquiterpenos.

Introdução

Hymenaea courbaril var. *stilbocarpa* (Leguminosae, Caesalpinioideae) conhecida como jatobá é uma espécie comum na América Central e Sul. A madeira dos jatobás é usada na construção civil e a resina, rica em diterpenos e sesquiterpenos, é usada na medicina popular¹. As folhas acumulam sesquiterpenos como o cariofileno e cubebeno, as sementes e as cascas, diterpenos². O extrato hidroalcoólico das cascas apresenta atividade analgésica e antiinflamatória². Estudos anteriores mostraram que o extrato hidroacetônico de folhas é rico em flavonóides e antocianinas e ativo nos bioensaios para as atividades acetilcolinesterásica (AChE) e antifúngicas³. O objetivo do presente trabalho foi identificar os compostos ativos do extrato.

Resultados e Discussão

Folhas de jatobá, coletadas de indivíduos adultos, ocorrentes no Jardim Botânico/SP, em fev/2006, foram submetidas a extração, com a mistura de acetona/água (1:1), no sistema de extração automático ASE (Dionex). O extrato hidroacetônico resultante forneceu, após partição líquido-líquido com *n*-hexano/água, uma fase orgânica (FO, 2%) e uma aquosa (FA, 8%)³ que foram monitoradas por cromatografia em camada delgada analítica comparativa (CCDC), sílica gel (F₂₅₄, Merck), CHCl₃/MeOH (9:1 e 8:2) e revelação com anisaldeído em solução ácida e ensaio enzimático com acetilcolina (AChE) pelo método de Marston⁴. O fracionamento bio guiado de FO foi feito por cromatografia flash que forneceu 13 frações (F1-F13). As frações bioativas F1-F4 (1,064g) foram purificadas em coluna aberta (sílica gel 0.63-230mm, Merck, 25g), com gradiente de *n*-hexano/AcOEt e forneceu 76 subfrações (J1-J76). A atividade enzimática foi observada nas frações J17-25 (68mg) e J26-30 (70mg). A mistura J17-25 (13,9mg) foi purificada em CCDP (1mm, sílica gel Merck Pf₂₅₄; Hex/Acetato de etila 7:3) e forneceu quatro subfrações. A subfração de R_f = 0,65 apresentou cor azul intensa em CCDC/ anisaldeído e foi identificada como o diterpeno **1**, com base nos dados de RMN de ¹H, RMN de ¹³C (500 e 125 MHz, Bruker, CDCl₃) e EM/EI (Agilent 5973 Network mass seletiv. detector 6890 EI 70 eV., temp. do injetor 240°C, detector 150°C, temp. da coluna 40-240°C,

30ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

3°C/min). Pelo espectro de RMN ¹H, um sistema ABX correspondente a uma dupla ligação terminal foi caracterizado pelos deslocamentos químicos (δ):4,9 (dd, *J* = 1Hz, 11Hz), 5,1 (dd, *J*= 1Hz e 16Hz) e 5,8 (dd, *J* =11Hz)e 16Hz). A posição do grupo hidroxila em C-2 foi determinada pelo espectro de RMN de ¹³C em δ 73,5. Análise dos dados dos carbonos e hidrogênios, associados aos dados de CG/IE: Tr = 61,48 min. com M⁺ = 288 (C₂₀H₃₂O) e íons de *m/z* (%) = 257 [M⁺ - 31, (100)], 273 [M⁺ -15 (50)], 161(25), 147(20) e 41(10) permitiram confirmar a estrutura do diterpeno **1**. As frações ativas J26-30 reunidas e analisadas por GC/EI, nas mesmas condições, forneceu um cromatograma de íons totais (CIT) com 34 picos. Os três picos majoritários com área acima de 8% foram atribuídos ao muuroladieno (Tr = 36.9min, 10,53%), ao λ-patchuleno (Tr = 39,99min, 14,50%) e ao diterpeno **1** (Tr = 61,48min, 8,63%), já isolado da F-J17-25. Os outros picos do CIT com áreas abaixo de 3.8% não foram analisados.

Conclusões

A FO do extrato hidroacetônico de folhas de *H. courbaril* var. *stilbocarpa* apresenta-se como uma mistura muito complexa de diterpenos e sesquiterpenos. O diterpeno **1** foi identificado nas duas frações bioativas.

Agradecimentos

FAPESP/BIOTA, IBt/SMA/SP, FUNDAP. Amanda de Souza IB/USP/SP.

¹Raquel T. Nogueira, George J. Sherpherd, Antonio Laverde, Anita J. Marsai A li, Paulo M. Imamura. *Phy.* 58(2001) 1153-1157.

²S.F. Khoo and A. C. Oehlschlager *Tetraedron* 1973, 29 3379-3388

³Barbosa M. P., C., Martins, M. C. M.; Aidar M. P.M, Lopes, E. M.C.; Young M.C.M.; Silva. B.V.Torres, L.M.B. 2007, 2007, PN 30^o

RASBQ, Águas de Lindóia /SP

⁴Marston, A., Kissling, J. & Hostettmann, K. 2002, *Phy Anal.*, 13: 51-5.