Planejamento e Síntese de Novos Triazóis como Agentes Antiofídicos

Vinícius Rangel Campos (IC)¹, Alessandro Kappel Jordão (PG)¹, Laura de Andrade Moura (PG)², Thaisa F. S. Domingos (PG)², André Fuly (PQ)², Maria Cecília B. Vieira de Souza (PQ)¹, Vitor Francisco Ferreira (PQ)¹, Fernanda da Costa Santos (PQ)¹, Carla Carvalho (IC)², Eladio F. Sanchez (PQ)³, Anna Claudia Cunha (PQ)^{1*}

E-mail: annac@vm.uff.br

¹Universidade Federal Fluminense, Instituto de Química, Departamento de Química Orgânica, Campus do Valonguinho, CEG, 24020-141, Niterói, RJ

²Universidade Federal Fluminense, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Celular e Molecular, Campus Valonguinho, CEG, 24210-130, Niterói, RJ

³Fundação Ezequiel Dias, Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, 30510-010, Belo Horizonte, MG

Palavras Chave: triazóis, diazo composto e antiofídicos

Introdução

No Brasil e em várias partes do mundo, os acidentes ofídicos representam grave problema para sua população, seja de saúde ou econômico.

O método de tratamento de pacientes acometidos por este tipo de acidente, normalmente é o da soroterapia no qual, na maioria das vezes, o efeito sistêmico é revertido, mas os efeitos locais nem sempre o são com eficácia¹, podendo resultar na necessidade de amputação de um membro e/ou deixar seqüelas permanentes na vítima. É necessária a busca por tratamentos alternativos, como por exemplo o emprego de substâncias que possam vir a ser capazes de neutralizar tais reações biológicas causadas pelo veneno de cobra.

Objetivos

Os triazóis têm despertado o interesse de nosso grupo de pesquisas, devido às suas inúmeras aplicações farmacológicas diversificadas².

Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo a síntese dos triazóis inéditos **4** (Esquema) como agentes antiofídicos.

Resultados e Discussão

A preparação dos compostos alvo **4a-f** está demonstrada no esquema a seguir. A primeira etapa envolveu a formação dos diazocompostos **I**, gerados *in situ* através da reação entre o diazoacetato de etila **2** e sulfonilidrazidas aromáticas **3a-f**²:

Esquema : Síntese dos triazóis inéditos **4**.

Estes triazóis **4a-f** foram caracterizados por métodos espectroscópicos, tais como infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de ¹H e de ¹³C. A avaliação *in vitro* de suas atividades inibitórias proteolítica, hemolítica e coagulante do veneno da serpente *Lachesis muta* (surucucu) foi efetuada observando-se neutralização significativa destes efeitos.

Conclusões

Os novos triazóis **4a-f** foram obtidos em bons rendimentos. Estas substâncias **4a-f** foram submetidas à avaliação farmacológica, *in vitro*, quanto à atividade antiofídica. O bioensaio permitiu identificar os análogos **4a**, **4b** e **4f** como potenciais candidatos a agentes antiofídicos.

Agradecimentos

FAPERJ e Programa de PG em Química da UFF.

¹Borges, R. C., Serpente Peçonhentas Brasileiras – Manual de Identificação, Prevenção e Procedimentos em Caso de Acidentes. Editora Atheneu – São Paulo 2001; p 21-85.

² Melo, J. O. F.; Donnici, C. L.; Augusti, R.; Ferreira, V. F.; Souza, M. C. B. V.; Ferreira, M. L. G.; Cunha, A. C.; Heterociclos 1,2,3-Triazólicos: Histórico, Métodos de Preparação, Aplicações e Atividades Farmacológicas, *Quim. Nova* **2006**, 29, 569.