Síntese e avaliação da atividade antimicrobacteriana de derivados contendo o núcleo quinolínico.

Marcelle de L. Ferreira^{1,2} (PG)*; Karla C. Pais^{1,2} (PG); Marcus V. N. de Souza¹ (PQ), Carlos R. Kaiser² (PQ); Mônica A. Peralta¹ (PQ); Maria C. S. Lourenço³ (PQ).

¹ Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far- Manguinhos) - FIOCRUZ. Rua Sizenando Nabuco, 100 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ

² Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68563, 21945-970- Rio de Janeiro - RJ

³ Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas – IPEC – Av. Brasil, 4365 - Manguinhos Rio de Janeiro – RJ

* e-mail: marcellef@gmail.com

Palavras Chave: núcleo quinolínico, tuberculose, atividade antimicrobacteriana.

Introdução

A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública mundial, sendo ainda hoje é responsável por cerca de 1,6 milhões de mortes por ano ao redor do mundo. No entanto, há aproximadamente 40 anos nenhuma nova classe de medicamentos foi desenvolvida para o tratamento desta enfermidade, por isso faz-se necessário o desenvolvimento de novos fármacos mais potentes, de baixo custo, com menores efeitos colaterais, com redução do tempo da terapia e eficazes frente a bacilos resistentes¹. Neste contexto, os derivados quinolínicos representam uma das principais classes de heterocíclios, que apresenta amplo espectro de atividade biológica, como por exemplo, atividade antiviral, antitumoral, anti-inflamatória, antileishmania, antifúngica, antimalárica, dentre outras². Sendo assim, o objetivo desse trabalho é a partir da 4,7-dicloroquinolina obter uma biblioteca de substâncias contendo o núcleo quinolínico, que serão avaliadas quanto a sua atuação no combate ao *Mycobacterium tuberculosis*.

Resultados e Discussão

A rota sintética para preparação dos derivados quinolínicos funcionalizados na posição C-4 (**1-2j**) está resumida no Esquema 1.

Reagentes e condições: a) diaminas correspondentes, 80-135°C, 4h, 51-94%; b) **2a**: NaN₃, DMF, 100°C, 3h, 70%; **2b**: phenol, NH₃(g), 170°C, 2h, 82%; **2c-j**: aminas ou aminoalcoois correspondentes, Et₃N, 60-120°C, 2-24h, 66-96%.

Esquema 1. Síntese dos derivados (1-2j).

Todas as substâncias sintetizadas tiveram suas estruturas confirmadas por dados espectroscópicos (LC/MS e RMN de ¹H e ¹³C). Estes derivados tiveram suas atividades antimicrobacterianas avaliadas *in vitro* frente ao *M. tuberculosis*, por meio

do ensaio de Alamar Blue e expressas em termos de concentração mínima inibitória (MIC) em µg/mL (Tabela 1).

Tabela 1. Identificação dos derivados sintetizados, rendimentos e suas respectivas atividades antimicrobacterianas.

Entrada	n ou R	Rend (%)	MIC (µg/mL)
(1a)	2	94	> 100.0 *
(1b)	3	90	> 100.0
(1c)	4	75	> 100.0
(1d)	6	55	25.0
(1e)	8	51	6.25
(1f)	10	60	3.12
(2a)	N ₃	82	> 100.0
(2b)	NH ₂	92	> 100.0
(2c)	NHMe	90	100.0
(2d)	NHPr	73	50.0
(2e)	NH ⁱ -Pr	66	50.0
(2f)	NHBU	83	12.5
(2g)	NHPrOH	96	> 100.0
(2h)	NH(R)CH(Et)CH ₂ OH	82	> 100.0
(2i)	NH(S)CH(Et)CH ₂ OH	80	> 100.0
(2j)	NH(R.S)CH(Et)CH ₂ OH	84	> 100.0

* MIC > 100.0 µg/mL indica que a cepa é resistente a substância testada.

Analisando os resultados farmacológicos obtidos, podemos observar que o tamanho da cadeia alquílica lateral é um fator extremamente importante para a atividade antimicrobacteriana desta classe de substâncias, visto que o aumento no número de carbonos é acompanhado pela diminuição do MIC, em ambas as séries sintetizadas.

Conclusões

Neste trabalho foram sintetizados dezesseis derivados contendo o núcleo quinolínico em bons rendimentos. Dentre eles, as substâncias (**1e**) e (**1f**) exibiram promissoras atividades antimicrobacterianas (MIC = 6,25 e 3,12 µg/mL, respectivamente).

1- www.who.int/tb/en/ (acessada em 20/01/2009)

2-De Souza, M. V. N et al, *Bioorg. Med. Chem*, 2009 (in press).