Utilização de Ácidos Trialo-isocianúricos como Reagentes de Desoximação

Haryadylla da C. Sindra* (IC), Gabriela F. Mendonça (PG), Marcio C. S. de Mattos (PQ)

Instituto de Química, Departamento de Química Orgânica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

*dylasindra@hotmail.com

Palavras Chave: oximas, desproteção, cetonas

Introdução

Oximas são facilmente preparadas a partir de compostos carbonilados.¹ Elas são muito úteis para a síntese orgânica quando utilizadas como grupo protetor de carbonilas.² Na literatura estão descritas várias metodologias para a regeneração de carbonilas a partir de oximas (desoximação), sendo que, em geral, essa reação ocorre em meio fortemente ácido ou na presença de um oxidante forte.³

Ácidos trialo-isocianúricos (TXCA) são oxidantes muito utilizados em síntese orgânica.⁴ O ácido tri-cloro-isocianúrico (TCCA) é um sólido estável, de baixo custo e facilmente encontrado no mercado nacional.⁵ Já o ácido tri-bromo-isocianúrico (TBCA) pode ser facilmente preparado a partir do ácido cianúrico, brometo de potássio e oxone.⁶

O projeto visa desenvolver uma nova metodologia alternativa para a conversão de oximas aos compostos carbonilados correspondentes utilizando ácidos trialo-isocianúricos.

Resultados e Discussão

As oximas da acetofenona, da 3-heptanona e da ciclohexanona foram preparadas a partir da reação do composto carbonilado com cloridrato de hidroxilamina em meio básico¹ (Esquema 1).

Esquema 1

O Esquema 2 apresenta as reações de desoximação pelos ácidos trialo-isocianúricos. Elas foram realizadas a temperatura ambiente e com o emprego de uma relação molar oxima : TCCA (1 : 1/3). Foram realizados estudos em acetona aquosa (meio A, Tabela 1) e em fase sólida sem solvente (meio B, Tabela 2). Esta última foi conduzida em gral de porcelana com agitação por pistilo dos reagentes, sendo observado que a regeneração do composto carbonilado ocorreu com apenas 2 minutos de reação. Todas as reações foram analisadas por cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR).

Esquema 2

Tabela 1. Reações de desoximação em meio aquoso (método A).

Oxima	Produto	TXCA	t (h)	Conv.(%) ^a
TCCA	1,2	65
		TBCA	24	89
TCCA	21	87
		TBCA	64	60
TCCA	21	58
		TBCA	64	89

^a Conversão determinada por CGAR.

Tabela 2. Reações de desoximação em meio sólido (método B).

Oxima	Produto	TXCA	t (min)	Conv.(%) ^a
TCCA	2	37
		TBCA	2	71
TCCA	2	62
		TBCA	2	34
TCCA	2	58

^a Conversão determinada por CGAR.

Conclusões

A nova metodologia proposta para a desoximação com TXCA é satisfatória, visto que é simples, limpa, fácil e segura.

Agradecimentos

CNPq

¹ de Mattos, M.C.S.; Kover, W. B.; *Química Nova*, **1994**, *17*, 123.

² Khazaei; A.; Manesh, A.A. *Synthesis*, **2004**, 1740.

³ Khazaei; A.; Manesh, A.A. *J. Braz. Chem. Soc.*, **2005**, *16*, 1740.

⁴ Pore, D.M. *et al. Synth. Commun.*, **2008**, *38*, 3121.

⁵ Wengert, M.; Sanseverino, A.M.; de Mattos, M.C.S. *J. Braz. Chem. Soc.*, **2002**, *13*, 700.

⁶ de Almeida, L. S.; Esteves, P. M.; de Mattos, M. C. S. *Synlett*, **2006** 1515.