Teor de flavonóides e atividades antioxidante e antifúngica dos extratos hexânico e acetato de etila das folhas de *C. xanthocarpa*

Camila S. Brum¹ (IC)*, Cláudia A. L. Cardoso¹ (PQ), Eric F. S. dos Santos¹ (IC), Raquel de O. Silva¹ (IC), Adriana M. Mestriner Felipe de Melo² (PQ). *camilasbrum@hotmail.com

¹Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Curso de Química, Caixa Postal 351, 79804-970, Dourados-MS;

²Centro Universitário da Grande Dourados, UNIGRAN, Dourados-MS.

Palavras Chave: *Campomanesia*, guabiroba, antifúngica

Introdução

Campomanesia xanthocarpa O. Berg é uma planta medicinal e alimentícia popularmente conhecida como guabiroba¹. Suas flores e folhas apresentam um aroma muito agradável, principalmente nos meses de floração, sendo atraída por animais e pássaros. Seu fruto é caracterizado por seu intenso aroma e sua alta concentração de vitamina C. Seu fruto pode ser consumido fresco ou usado para fazer sucos, licores e doces². O presente trabalho tem como objetivo avaliar os teores de fenóis e flavonóides e as atividades antioxidante e antifúngica das folhas de *C.xanthocarpa*.

Resultados e Discussão

As folhas de *C. xanthocarpa* foram coletadas em maio de 2008 em Itaporã-MS. As mesmas (1037,54 g) foram trituradas e colocadas em contato com hexano e acetato de etila, seqüencialmente, para a extração de seus constituintes. Efetuou-se a separação por filtração simples e os extratos obtidos foram concentrados em evaporador rotativo e secos em capela. Os extratos foram diluídos e nestes foram realizados testes de fenóis³, flavonóides⁴, atividades antioxidante⁵ e antifúngica⁶. O extrato hexânico foi o que apresentou menores valores de percentual de inibição sendo obtida a redução em torno de 50% do radical livre na maior concentração testada (Figura 1). O teste com o radical livre DPPH foi realizado em triplicata e o coeficiente de variação (CV) obtido foi menor que 2%. Com relação a fenóis o extrato hexânico apresentou maior valor do que o extrato acetato de etila. Com relação a flavonóides o extrato hexânico apresentou menor valor do que o extrato acetato de etila (Tabela 1). Entre o teor de flavonóides e atividade antioxidante houve correlação em ambos os extratos. O mesmo não ocorreu entre o teor de fenóis e atividade antioxidante. Nas análises da atividade antifúngica foi empregado como controle negativo água:etanol 2:8 v/v e fluconazol (50µg) como controle positivo. As triplicatas deste teste apresentaram um CV menor que 5%. Os dois extratos apresentaram halo de inibição, sendo mais expressiva a resposta do extrato acetato de etila (1,0 cm) do que do extrato hexânico (0,7 cm) para *Candida albicans*.

32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

Tabela 1. Teores de fenóis e flavonóides em extratos das folhas de *C.xanthocarpa*.

Amostras	Fenóis (mg/g)	CV (%)	Flavonóides (mg/g)	CV (%)
Extrato hexânico	42,05	1,0	131,52	1,1
Extrato acetato de etila	7,63	0,3	243,43	1,3

Figura 1. Percentual de inibição dos extratos das folhas de *C.xanthocarpa*.

Conclusões

Através das análises realizadas com os extratos das folhas de *C. xanthocarpa*, conclui-se que o extrato acetato de etila apresentou maiores valores de flavonóides e de atividades antioxidante e antifúngica.

Agradecimentos

CAPES, FUNDECT, PIBIC-UEMS

¹ Biavatti, M. W.; Farias, C.; Curtis, F.; Brasil, L. M.; Hort, S.; Schuster, L.; Leite, S. N e Prado, S. R. T. *J. Ethnopharmacol.* **2004**, *93*, 385.

² Lorenzi, H. *Arvores Brasileiras: Manual de identificação e Cultivo de plantas Arbóreas Nativas do Brasil*. Instituto Plantarum de Estudos da Flora: Nova Odessa-SP, **2000**, p. 299.

³ Djeridane, A.; Yousfi, M.; Nadjemi, B.; Boutassouna, D.; Stocker, P.; Vidal, N. *Food Chem.*, **2006**, *97*, 654.

⁴ Lin, J-Y e Tang, C-Y. *Food Chem.* **2007**, *101*, 140.

⁵ Kumaran, A.; Karunakaran, R. *J. Food Chem.*, **2006**, *97*, 109.

⁶ Brasileiro, B. G.; Pizzolo, V. R.; Raslan, D. S.; Jamal, C. M. e Silveira, D. *Rev. Bras. Ciên. Farm.* **2006**, *42*, 195.