Citotoxicidade de compostos de fórmula geral [Ru(AA)(dppb)(bipy)]PF₆ (AA=aminoácidos; dppb=1,4-bis(difenilfosfina) butano; bipy=2,2'-bipiridina)

Marcio A. P. Almeida^a (PG)*, Alzir A. Batista^a (PQ), Angélica E. Graminha(PG), Javier Ellena^b (PQ), e Eduardo E. Castellano^b (PQ)

^aDepartamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, CEP. 676, 13.565-905 São Carlos-SP, Brasil

^bInstituto de Física de São Carlos, USP-SP, CEP. 369, 13.560-970 São Carlos-SP, Brasil *marcioaurelio14@gmail.com

Palavras Chave: aminoácidos, rutênio, complexos, antitumorais..

Introdução

Na literatura são descritos vários complexos com atividades antitumorais, sendo o cisplatina um dos principais fármacos usado no tratamento do câncer¹. Compostos de rutênio vem chamando atenção, pois alguns de seus complexos tem mostrado promissoras atividades, tanto antitumorais, como antibactericidas². Complexos do tipo [Ru(AA)(dppb)(bipy)]PF₆, onde, AA=Gly(1), L-Tyr(2), L-Met(3) e L-Leu(4), L-Val(5), L-Ser(6), L-Trp(7), L-Ala(8), L-Lys(9) foram sintetizados e caracterizados neste trabalho, usando como precursor o *cis*-[RuCl₂(dppb)(bipy)], sendo estes caracterizados por RMN ³¹P{¹H}, voltametria cíclica(VC), voltametria de pulso diferencial(VPD), análise elementar, espectroscopia de absorção na região do IV/UV/Vis e difração de raios X.

Resultados e Discussão

Os espectros de RMN ³¹P{¹H} dos complexos obtidos apresentam quatro dubletos, com exceção do composto com glicina(Fig 1;Tab.1), o que pode ser explicado pela formação de dois diastereoisômeros dos compostos. Na voltametria cíclica os compostos apresentam processo de oxidação quasi-reversível rutênio(III)/rutênio(II), em torno de 1100 mV. Testes de citotoxicidade do compostos, usando células MDA-MB-231(câncer de mama) e o brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium(MTT) foram realizados.Todos os compostos mostaram-se ativos, com valores de IC₅₀ bastante promissores.

Figura 1. Espectro de RMN ³¹P{¹H} do [Ru(L-Ala)(dppb)(bipy)]PF₆ em CH₂Cl₂/D₂O.

Tabela 1. Deslocamento químico, voltametria cíclica e IC₅₀ para [Ru(AA)(dppb)(bipy)]PF₆.

Comp.	Desl. químico de RMN ³¹ P{ ¹ H}, ppm			
		² J _{P-P}		² J _{P-P}
1	45,7, 38,5	32,3	-----	-----
2	46,4, 38,6	34,4	41,8, 37,8	32,7
3	47,8, 38,6	32,6	43,6, 38,8	32,0
4	46,4, 38,8	32,4	43,9, 39,2	34,4
5	46,2, 37,6	34,2	41,5, 37,9	32,2
6	48,1, 40,6	36,0	45,7, 40,8	37,0
7	46,2, 38,4	32,3	42,5, 38,6	32,2
8	47,5, 39,0	33,2	45,4, 39,3	32,8
9	46,4, 38,8	32,4	44,0, 39,0	32,3
Voltametria cíclica, mV				IC ₅₀ μ.mol ⁻¹
	Catódico	Anódico		
	E _{ps} (mV)	E _{pc} (mV)	E _{1/2}	
1	1088	1010	1049	14,5
2	1122	998	1060	21,3
3	1045	1030	1037	5
4	1077	927	1002	7,1
5	1077	957	1017	-----
6	1148	976	1062	24,1
7	1102	-----	Irrev.	-----
8	1114	995	1055	28,3
9	1130	1061	1096	-----

IC₅₀ da cisplatina = 129 μ.mol⁻¹

Conclusões

Os compostos sintetizados apresentaram mistura de diastereoisômeros, exceto o composto com glicina. Por HPLC foi possível separar os diastereoisômeros para o complexo com a serina. O processos de oxi-redução Ru(III)/Ru(II) dos compostos indicam que os potenciais redox dos diastereoisômeros são iguais, ou muitos próximo e não distinguíveis por VC ou VPD. Medidas de citotoxicidade na linhagem celular MDA-MB-231 mostraram resultados promissores.

Agradecimentos

FAPESP, CAPES, CNPq e FAPEMA.

¹ 1-Viktor Brabec, Olga Novakov. *Drug Res. Updates* **2006**, 9, 111

² Fábio B. do Nascimento, Gustavo Von Poelhsitz, Alzir A. Batista, et. al. *J. Inorg. Biochem.* **2008**, 102, 1783.