Aplicação do conceito *scale-up* no isolamento de derivados do ácido galoilquinico de *Byrsonima fagifolia* por HPLC

Leonardo Perez de Souza (IC)^{*}, Viviane Cândida da Silva (PQ), Lourdes Campaner dos Santos (PQ), Wagner Vilegas (PQ), Clenilson Martins Rodrigues (PQ) leonardoperezz@hotmail.com

Departamento de Química Orgânica, IQ - UNESP, C.P. 355, CEP 14800-900 - Araraquara - SP, Brasil.

Palavras Chave: HPLC-PDA, *scale-up*, infusão, *Byrsonima fagifolia*.

Introdução

Byrsonima fagifolia é uma espécie nativa do Cerrado brasileiro. Seus frutos são utilizados como alimento e a infusão de suas cascas e folhas empregada na medicina popular. Com relação às atividades biológicas, *B. fagifolia* demonstrou promissora atividade antiulcerogênica, anti-diarréica, antimicrobiana e contra *Helicobacter pylori*¹. A complexidade do infuso dificulta a utilização de técnicas de isolamento convencionais na busca das substâncias responsáveis pelas atividades observadas. Portanto, este trabalho descreve procedimento para isolamento em HPLC semi-preparativo, sendo empregado o conceito de *scale-up* no desenvolvimento do método de separação no modo analítico para transposição no modo semi-preparativo.

Resultados e Discussão

Os derivados do ácido galoilquinico (DAGQ) das folhas de *B. fagifolia* (100 g) foram inicialmente extraídos a partir de uma infusão (10% m/v). O infuso obtido foi particionado entre H₂O/ACOEt (1:1 v/v). As camadas orgânica e aquosa foram separadas e secas (7,2 g e 6,6 g). A partir de uma alíquota da porção aquosa, que concentra os DAGQ, o método de separação por HPLC analítico foi otimizado. Diante da complexidade da matriz, um fracionamento prévio foi realizado em Sephadex LH-20 com MeOH 80%. As frações obtidas, depois de reagrupadas de acordo com similaridade, foram analisadas por HPLC no método otimizado e a etapa de isolamento e purificação efetuados em modo semi-preparativo. O estabelecimento do fluxo usado no modo semi-preparativo foi baseado nas características das colunas, sendo a analítica de dimensões de 250 x 4,6 mm; d.i. e a semi-preparativa de 250 x 10 mm; d.i. Desta forma, o fator de transposição linear (*scale-up*) foi obtido pela razão de suas áreas seccionais².

$$\text{Fator de transposição} = \frac{\pi r_{\text{coluna preparativa}}^2}{\pi r_{\text{coluna analítica}}^2} = \frac{r_{\text{coluna preparativa}}^2}{r_{\text{coluna analítica}}^2}$$

O gradiente empregado, com fluxo de 1 mL min⁻¹, viabilizou a separação de uma série de substâncias distribuídas em um intervalo de aproximadamente 35 min (Fig. 1a).

32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

transposição encontrado (4,7), foi possível chegar a uma separação semi-preparativa equivalente àquela obtida em escala analítica (Fig. 1b).

Figura 1. a) separação em escala analítica, 1 mL min⁻¹, b) separação em escala analítica, fluxo 4,7 mL min⁻¹. FM: ACN+TFA 0,1% e H₂O+TFA 0,1%. Colunas: Phenomenex[®] Synergi Hydro.

Conclusões

A estratégia empregada viabilizou o isolamento preliminar de 14 DAGQ, os quais foram caracterizados com o auxílio de técnicas espectroscópicas e cromatográficas e em quantidades significativas para posterior execução de ensaios farmacológicos.

Agradecimentos

Biota/Fapesp.

¹ Lima, Z. P., Dos Santos, R. C., Torres, T. U., Sannomiya, M., Rodrigues, C. M., Hiruma-Lima, C. A. *J. Ethnopharmacol.* **2008**, *120*, 149.

² Majors, R. E. *The Magazine of Separation Science-LC*GC*, **2004**, *7*, 8.