Caracterização de um Complexo Sensor de SO₂: Espectroscopia Raman e Cálculos Teóricos.

Rômulo A. Ando*¹ (PG), Antonio C. Borin¹ (PQ), Björn. O. Roos² (PQ) e Paulo S. Santos¹ (PQ).
*raando@iq.usp.br

¹Instituto de Química – USP. Av. Prof. Lineu Prestes, 748, B4T, sala 411, São Paulo – SP 05508-000 – Brasil.

²Department of Theoretical Chemistry, University of Lund, Chemical Center PO Box 124, S-221 00, Lund, Sweden.

Palavras Chave: sensor colorimétrico de SO₂, microscopia Raman, transferência de carga, CASSCF/CASPT2.

Introdução

O fato do dióxido de enxofre (SO₂) ser um dos principais poluentes atmosféricos, tem levado a um grande número de estudos voltados para sua detecção, monitoramento e quantificação.¹ O desenvolvimento de sensores de SO₂ depende criticamente de um conhecimento mais aprofundado da interação em nível molecular do SO₂ com diversos substratos orgânicos e inorgânicos. Particularmente, o complexo de coordenação bme-dach-Ni (Figura 1) é capaz de detectar SO₂ visualmente na faixa de ppm. No presente trabalho a espectroscopia Raman em conjunto a cálculos de química quântica foram empregados na caracterização deste complexo com o intuito de compreender mais profundamente a natureza da unidade cromofórica responsável pela alteração de cor durante o processo de captação do SO₂.

Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra o complexo bme-dach-Ni.

Figura 1. Estrutura do complexo bis-mercaptopetano-diazacicloheptano-níquel, N₂S₂Ni(II).

A Figura 2 mostra a mudança de cor do complexo N₂S₂Ni(II) durante a absorção de SO₂.

Figura 2. Absorção/desorção do SO₂ pelo complexo N₂S₂Ni(II).

A difração de raios-X² do complexo N₂S₂Ni(II)•2SO₂ mostra que uma das moléculas de SO₂ está coordenada ao átomo de enxofre do tiolato, enquanto a segunda molécula de SO₂ é responsável pela ligação em “ponte” de diferentes

unidades do complexo N₂S₂Ni(II). Apesar de a difração de raios-X ter mostrado a presença de duas moléculas de SO₂ não equivalentes, os dados de espectroscopia no infravermelho (IR) mostram a presença de apenas um único tipo de SO₂.²

A Figura 3 mostra os espectros Raman³ dos complexos N₂S₂Ni(II)•1SO₂ e N₂S₂Ni(II)•2SO₂ obtidos em um sistema Raman confocal excitados em λ₀=633 nm.

Figura 3. Espectros Raman dos complexos N₂S₂Ni(II)•1SO₂ e N₂S₂Ni(II)•2SO₂.

Os espectros Raman indicam a presença de dois complexos de SO₂ distintos, em que as duas bandas atribuídas ao estiramento simétrico do SO₂, ν_s(SO₂) no espectro do complexo N₂S₂Ni(II)•2SO₂, representam um SO₂ mais fortemente ligado (1070 cm⁻¹), e um mais fracamente ligado (1090 cm⁻¹) de acordo com a estrutura de raios-X proposta.

Conclusões

Através da microscopia Raman foi possível distinguir os complexos de diferentes estequiometrias formados entre o sensor N₂S₂Ni(II) e o SO₂. Além disso, os dados de absorção eletrônica (UV-Vis) e de cálculos de química quântica indicam a natureza da interação de transferência de carga entre as espécies.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq, FAPESP e IMMC2.

¹ Leontiev, A.V.; Rudkevich, D.M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 14126.

² Golden, M.L.; Yarbrough, J.C.; Reibenspies, J.H.; Darensbourg, M.Y. *Inorg. Chem.* **2004**, 43, 4702.

³ Ando, R.A.; Santos, P.S. *Vib. Spectrosc.* **2009**, 49, 14.