Síntese de novos complexos de Pt(II) e aminonaftoquinonas com potencial atividade anti-câncer

Amanda P. Neves^{1*} (PG), Gustavo B. da Silva¹ (IC), Maria D. Vargas¹ (PQ), Carlos B. Pinheiro² (PQ), Lorenzo do C. Visentim³ (PQ)

e-mail: amandanevess@gmail.com

¹Instituto de Química – UFF ; ²Instituto de Física – UFMG; Instituto de Química - UFRJ

Palavras Chave: aminonaftoquinonas, complexos de platina, atividade anti-câncer.

Introdução

Complexos de Pt(II) têm sido extensivamente investigados e usados como agentes antineoplásicos¹ desde a descoberta da *cisplatina* [*cis*-diaminodichloroplatina(II)], na década de 70. No entanto, o tratamento com *cisplatina* tem efeitos nefrotóxicos e neurotóxicos, além da resistência adquirida pelo organismo² e, portanto, a busca por novas drogas de platina é necessária. Outra classe de compostos que exibe atividade antitumoral comprovada é a das naftoquinonas³. No entanto, complexos de platina contendo aminonaftoquinonas como ligantes ainda não foram descritos na literatura. A seguir, descrevem-se a síntese e a caracterização de novos complexos de Pt(II) com aminonaftoquinonas.

Resultados e Discussão

Os ligantes aminonaftoquinônicos **HL1-HL4** foram obtidas *via* reação de *Mannich* da lausona⁴ e os complexos de platina foram sintetizados a partir da reação entre [Pt(NH₃)₂(DMF)₂]⁵ e os respectivos ligantes em DMF (Fig. 1).

Figura 1. Síntese das aminonaftoquinonas **HL1-HL4** e dos complexos **1-4**.

Os produtos **HL1-HL4** e **1-4** foram caracterizados por IV, RMN de ¹H 1D e 2D e de ¹³C, UV-vis, análise elemental e voltametria cíclica (VC). Os complexos **1-4** são solúveis em água. A estrutura do composto **4** foi determinada por um estudo de difração de raios X (Fig. 2). A estrutura molecular do complexo mostra a platina coordenada através de uma única molécula de naftoquinona desprotonada, que atua como ligante bidentado, coordenando-se através dos átomos de nitrogênio e formando um anel de cinco membros com o centro metálico. Duas moléculas de amônia completam a esfera de coordenação da Pt(II) que exibe geometria quadrática plana e contém o contra-íon nitrato.

32^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

Figura 2. Estrutura molecular de **4**.

Dados: AE do sólido calcd para C₂₁H₂₁O₇N₅Pt.2H₂O, **4**; C. 36.74; H. 3.67, N. 10.20; enc. C. 35.03, H. 3.53, N. 10.73. RMN de ¹H de **4** (D₂O, 300 MHz): δ 8.22 (d, J = 6.21 Hz, 1H, H16); 7.97-7.86 (m, 3H, H14/H5/H21); 7.80 (d, J = 7.81 Hz, 1H, H8); 7.80 (t, J = 7.81 Hz, J = 7.81 Hz, 1H, H6); 7.71 (t, J = 7.81 Hz, J = 7.81 Hz, 1H, H7); 7.61 (t, J = 6.21 Hz, J = 6.21 Hz, 1H, H15); 7.26-7.19 (m, 1H, H13); 6.49 (d, J = 2.62 Hz, 1H, H19); 6.19 (dd, J = 2.62 Hz, J = 2.49 Hz, 1H, H20); 5.69 (s, 1H, H11); 4.15 (s, 2H, H17). O estudo de VC do complexo em MeOH/0,1 mol/L Bu₄NPF₆ com eletrodo de carbono vítreo, fio de Pt (contra eletrodo) e Ag/AgCl (ref) mostrou somente um processo *quasi*-reversível de redução da naftoquinona a semiquinona (E_a = -0,774, E_c = -0,899V vs Fc), confirmando que o O(2) está desprotonado. Os dados analíticos e espectroscópicos dos demais complexos indicam uma estrutura semelhante a **4**.

Conclusões

Complexos inéditos de Pt(II) com aminonaftoquinonas foram obtidos e caracterizados. Os estudos de atividade antitumoral e citotóxica encontram-se em andamento.

Agradecimentos

FAPERJ-Pronex, CNPq, Capes.

¹ Dietrich, A. et al. *J. Med. Chem.* **2008**, *51*, 5413.

² Reedijk, J. *Chem. Comm.* **1996**, 801.

³ Da Silva, M, N. et al. *Quim. Nova.* **2003**, *26*, 407.

⁴ Baramée, A. et al. *Bioorg. Med. Chem.* **2006**, *14*, 1294.

⁵ Jawbry, S.; Freikman, I.; Najajreh, Y.; Perez, J. M.; Gibson, D. J. *Inorg. Biochem.* **2005**, *99*, 1983.