Dicetopiperazinas isoladas do fungo endofítico *Penicillium crustosum*.

Warley de S. Borges¹ (PG), Noemi J. Vieira¹ (PG), Rosa Durán-Patrón² (PQ), Isidro Gonzalez Collado² (PQ), Carlos H. T. P. da Silva¹ (PQ), Mônica T. Pupo¹ (PQ)* mtpupo@fcrp.usp.br

¹ Universidade de São Paulo, Avenida do Café s/n. 14040-903 – Ribeirão Preto – SP – Brasil.

² Universidad de Cádiz, 11510 Puerto Real – Cádiz - España.

Palavras Chave: *O*-preniltirosil-dicetopiperazinas, fungo endofítico, *Penicillium crustosum*, modelagem molecular.

Introdução

Dicetopiperazinas são metabólitos secundários comumente produzidos por fungos.¹ Normalmente estes compostos apresentam diversas atividades biológicas, tais como: antibiótica, antitumoral e imunossupressora.² Do fungo endofítico *Penicillium crustosum* (VR4), isolado de folhas de *Viguiera robusta*, foram isolados três dicetopiperazinas (1-3), sendo uma inédita na literatura (3). Este trabalho descreve a elucidação estrutural e análise conformacional destes compostos.

Resultados e Discussão

Durante um processo de biotransformação do composto 1-tetralona (figura 1) o fungo *P. crustosum* produziu três dicetopiperazinas (figura 2). O mesmo fungo quando cultivado sem adição do substrato não produziu tais compostos.

Figura 1. Esquema representativo do cultivo do fungo *P. crustosum* e obtenção das dicetopiperazinas.

Figura 2. Dicetopiperazinas isoladas do fungo *P. crustosum*.

Interessantemente, o mesmo fungo quando cultivado na presença de 10 % do composto ácido clorogênico produziu as dicetopiperazinas 1 e 2 que foram identificadas por comparação via HPLC com os padrões previamente isolados.

O espectro de RMN ¹H de 1 e 2 mostrou que o sinal referente ao grupamento -SCH₃ ligado a C3 está mais blindado no composto 2 sugerindo uma relação *cis* com o grupamento *O*-preniltirosil adotando uma conformação dobrada, estabilizada pela interação CH/ π . Esta conformação foi confirmada por experimentos de n.O.e. irradiando-se os hidrogênios do grupamento -SCH₃, o que levou ao aumento de intensidade dos sinais dos hidrogênios aromáticos. Os compostos 1 e 2 foram submetidos a análise conformacional usando o software Spartan '06 1.1.2. Dois conformêros de baixa energia, um estendido (A) e um dobrado (B), foram obtidos para o composto 2 já para o composto 1 a conformação estendida foi a preferencial (C) (figura 3).

Figura 3. Análise conformacional das substâncias 1 (C) e 2 (A e B)

Conclusões

A associação de técnicas de RMN ¹H, n.O.e. e modelagem molecular permitiu a proposição da conformação dobrada para 2, possível pela estabilização via interação CH/ π . É interessante destacar que as dicetopiperazinas só foram produzidas por *P. crustosum* em experimentos de biotransformação da 1-tetralona (1-3) e ácido clorogênico (1-2). Portanto, estes compostos podem estar relacionados a uma resposta de defesa do fungo frente a um fator de estresse (substâncias químicas adicionadas ao meio).

Agradecimentos

FAPESP, CAPES e CNPq

¹ Laws, I.; Mantle, P. G. *Phytochemistry* **1985**, *4*, 1395.

Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

² Ameer, R. M. B.; Mellouli, L.; Chabchoub, F.; Fotso, S.; Bejar, S.;

Chem. Nat. Compd. **2004**, *40*, 510.