ESTUDO CINÉTICO NÃO-ISOTÉRMICO DE COMPOSTOS NATURAIS BIOATIVOS: DIOSGENINA E SOLASODINA

Marcelo A. da Silva²(PG)*, Alexsandro F. dos Santos² (PG), Petrônio F. de Athayde Filho^{1,2} (PQ), José R. Botelho² (PQ), Yuri A. S. Canuto²(IC), José A. de S. Luis(PQ)^{1,3}

¹ Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, UFPB, João Pessoa - PB, Brasil.

² Departamento de Química-LPBS, UFPB, João Pessoa - PB, Brasil.

³ Centro de Educação e da Saúde, UFCG, Cuite-PB, Brasil.

*E-mail: alx-sandro@hotmail.com

Palavras-Chave: diosgenina, solasodina, cinética

Introdução

A diosgenina é uma sapogenina esteroidal que pode ser encontrada em diversas espécies vegetais e particularmente em raízes do inhame selvagem (*Dioscorea villosa*)¹. A solasodina é um alcalóide esteroidal, encontrado na natureza em muitas plantas da família das solanáceas (jurubeba), particularmente do gênero *Solanum*². Ambas podem ser usadas na indústria farmacêutica como precursores na síntese de hormônios esteroidais e na síntese de drogas antiinflamatórias. Outra área em que a diosgenina e a solasodina tem sido muito pesquisada é a de terapia anticâncer já que elas são indutoras do apoptose em alguns tipos de células cancerosas. A maioria das reações do estado sólido pode ser representada pela equação:

$$g(\alpha) = k(T)t$$

Onde: α = fração decomposta no tempo t ; $K(T)$ = constante de velocidade; $g(\alpha)$ = é a forma matemática integrada que representa o modelo cinético da reação.

Neste trabalho o método cinético de decomposição de sólidos utilizado foi o não-isotérmico usando a equação: (E) energia de ativação, (A) fator de frequência, $p(x)$ integral de temperatura.

$$g(\alpha) = \frac{AE}{R\phi} p(x)$$

Os métodos de aproximação utilizados neste trabalho para determinar o mecanismo da decomposição da diosgenina foram: Coats-Redfern(CR)³, Madhusudan(MD), VanKrevelen (VK) e Horowitz-Metzger(HM).

Resultados e Discussão

A diosgenina e a solasodina, fusão 203°C e 202 °C (DSC) foram extraídas e caracterizadas pelas técnicas espectroscópicas e espectrométricas. Ambas apresentou perda de massa em um único evento, atribuída ao processo de decomposição térmica das mesmas. A pequena perda de massa inicial, nas três razões de aquecimento (5, 10 e 15°C.min⁻¹), em ambos compostos foi atribuída à evaporação de solvente residual das amostras. As mudanças nas razões de aquecimento nos dois experimentos não alteraram significativamente as perdas de massa. Contudo, percebe-se que à

medida que se aumenta a razão de aquecimento, há um aumento concomitante nas temperaturas de decomposições. Verificadas, fig.1, para a diosgenina.

Fig.1 Sobreposição das curvas termogravimétricas não-isotérmicas obtidas em diferentes razões de aquecimento para a diosgenina.

Os parâmetros cinéticos não-isotérmicos obtidos para a diosgenina e a solasodina, através das equações de CR, MD, VK e HM, apresentaram sempre valores de coeficiente de correlação(r) próximos de 1,0 nas três razões de aquecimento, com energias de ativação (E) bem próximas.

Na escolha do mecanismo para o evento de decomposição térmica, o modelo que melhor se ajustou para os dois estudos foi o R2, ou seja, $1-(1-\alpha)^{1/2}$, baseado no modelo geométrico com crescimento bidimensional com simetria cilíndrica.

Conclusões

A diosgenina e a solasodina são bastantes estáveis e apresentaram fusões antes da decomposição térmica e decompõe-se em uma única etapa. Nos dois estudos, o modelo cinético que melhor se ajustou pelo método não-isotérmico foi o R2 onde apresentou os melhores parâmetros cinéticos, tais como, energia de ativação(E), fator de frequência(A) e coeficiente de correlação(r).

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq pelo apoio financeiro

1 Narula, A.; Kumar, S.; Srivastava, P. S., *Biotech. Letters*2007,29,623.

2 Trivedi, P.; Pundarikakshudu, K., *Chromat.* , 65 (2007) 239

3 Coats, A. W.; Redfern, J. P., *Nature*, 201: 68, 1964