LASSBio-448: Novo protótipo antiasmático inibidor de PDE-4

Isabelle K. da C. Nunes (PG)¹, Suzana V. Cardoso (PG)², Nelilma C. Romeiro (PQ)¹, Carla M. S. Menezes (PG)¹, Marco A. Martins (PQ)², Patrícia M. R. Silva (PQ)², Claire Lugnier (PQ)¹, Luana Braga Pontes (PG)¹, Gisele Z. Sudo (PQ)¹, Roberto T. Sudo (PQ)¹, Eliezer J. Barreiro (PQ)¹, Lidia M. Lima (PQ)¹. isabellekarinecn@yahoo.com.br

¹Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas (LASSBio®), Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21941-902, Rio de Janeiro, Brasil. ²Laboratório de Inflamação, Fundação Oswald Cruz (Fiocruz), Brasil; ³Universidade de Estrasburgo, Estrasburgo, França.

Palavras Chave: LASSBio-448, antiasmático, fosfodiesterase, docking

Introdução

As Fosfodiesterases (PDEs) constituem superfamília de enzimas responsáveis pela degradação – via hidrólise da ligação 3'-éster de fosfato – de adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPC) e guanosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPC), importantes segundos mensageiros envolvidos com respostas de sinalização e homeostasia celular, incluindo produção e liberação de mediadores inflamatórios, relaxamento muscular, vasodilatação e apoptose.^{1,2} Na busca por novos candidatos a protótipos de fármacos antiasmáticos, tendo em vista as fosfodiesterases como alvos moleculares, este trabalho descreve o desenho, síntese e avaliação do perfil antiasmático de uma série de derivados 5*N*-fenetil-6-metilbenzo[d][1,3]dioxola-5-sulfonamida funcionalizados, racionalmente planejados como inibidores de PDE-4.

Resultados e Discussão

A série de derivados 5*N*-fenetil-6-metilbenzo[d][1,3]dioxola-5-sulfonamida funcionalizados foi racionalmente planejada aplicando-se as estratégias de bioisosterismo não clássico e simplificação molecular sobre a estrutura do protótipo sulfonamídico, descrito como inibidor seletivo de fosfodiesterase-4 (PDE4).³ Os novos derivados sulfonamídicos foram obtidos utilizando o safrol, produto natural brasileiro, como matéria prima sintética, permitindo a obtenção dos compostos alvo em bons rendimentos globais. Os 12 derivados sintetizados foram ensaiados quanto sua capacidade de inibir a enzima PDE-4, mostrando concentrações inibitórias (IC₅₀) da ordem 2,1 a 15 µM, comparável aquela encontrada para o protótipo rolipram (IC₅₀= 5 µM). Dos oito derivados ativos, LASSBio-448 foi selecionado para estudos de ancoramento molecular (*i.e.* docking) com a enzima PDE-4 e posterior avaliação do seu perfil de atividade farmacológica *in vivo*. Os estudos de ancoramento molecular com a PDE-4 evidenciaram interações favoráveis envolvendo ligações de hidrogênio entre os átomos de oxigênio do grupo metoxila de LASSBio-448 com resíduo de glutamina-369 e entre o nitrogênio sulfonamídico com resíduo de histidina-160 (Figura 1).

Figura 1. Complexo obtido para LASSBio-448 e a PDE4D (código no PDB= 1XOR) utilizando o programa de ancoramento molecular FlexX (Sybyl 8.0, Tripos, Inc., Licença: 7512). Os átomos de hidrogênio do ligante foram omitidos para melhor visualização. Interações por ligação hidrogênio estão demonstradas por linhas pontilhadas amarelas.

Os ensaios realizados com LASSBio-448 em modelo murino de asma crônica evidenciaram sua capacidade de inibir a hiperreatividade brônquica e a inflamação pulmonar em camundongos previamente sensibilizados e estimulados com metacolina.

Conclusões

Foi descrito a descoberta de uma nova série de inibidores da PDE-4, com atividade antiasmática *in vivo* por via oral. Dentre os compostos da série destaca-se LASSBio-448 com interações favoráveis com a enzima PDE-4 e perfil antiinflamatório e broncodilatador, caracterizando-o como autêntico candidato a fármaco antiasmático.

Agradecimentos

FAPERJ, INCT-INOFAR, CNPq, CAPES, FAPEAL.

¹ Soderling, S. H. & Beavo, J. A. *Curr. Opin. Cell Biol.* **2000**, 12: 174-179.

² Sutherland, E. W. & Rall, T. W. *J. Biol. Chem.* **1958**, 232: 1077-1091.

³ Montana, J. G.; Buckley, G. M.; Cooper, N.; Dyke, H. J.; Gowers, L.; Gregory, J. P.; Hellewell, P. G.; Kendall, H. J.; Lowe, C.; Maxey, R.; Miotla, J.; Naylor, R. J.; Runcie, K. A.; Tuladhar, B.; Warneck, J. B. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1998**, 8: 2635-2640.