Perfil de Substâncias Fenólicas e Atividade Antioxidante do Mel de Assa Peixe

Milene Aparecida Pereira (IC), Carlos Alberto Fonseca Jardim Vianna (PG), Luiza D'Oliveira Sant'Ana (PG) e Rosane Nora Castro (PQ). e-mail: milenecambui@yahoo.com.br

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ICE, Departamento de Química, 23890-000, Seropédica, RJ, Brasil.

Palavras Chave: Mel de assa peixe, Substâncias Fenólicas, Atividade Antioxidante.

Introdução

O mel é um complexo produto natural e seu valor comercial está relacionado à sua origem floral. Alguns méis monoflorais, por exemplo, são mais apreciados do que outros, especialmente pelos seus sabores e aromas diferenciados. Dados científicos indicam que propriedades biológicas como atividade antioxidante dos méis, deve-se em parte ao seu alto conteúdo de substâncias fenólicas¹. A presença dessas substâncias no mel e nos seus extratos fenólicos apresenta correlação significativa com sua capacidade antioxidante². Neste trabalho foi avaliada a atividade antioxidante do mel monofloral de assa peixe em correlação com o seu teor de fenóis e flavonóides totais.

Resultados e Discussão

A amostra de mel foi obtida de São Lourenço/MG, e a partir dela, cinco diferentes extratos (EMM, EMA, EME, EAPAc e EAPAc2) foram preparados. O método de Folin-Denis³ foi empregado para determinação do teor de fenóis totais do mel e os resultados foram expressos como equivalentes de cada ácido (figura 1).

Figura 1

Para a determinação do teor de flavonóides totais no mel, foi usado o método colorimétrico com solução de $AlCl_3$, e os resultados foram expressos como equivalentes de cada flavonóide (figura 2).

Figura 2

A capacidade de sequestro de radicais foi medida por meio do ensaio do radical livre DPPH (2,2-difenilpicrilhidrazil), sendo determinada em trabalho anterior⁴ com os padrões das substâncias fenólicas quercetina e ácido gálico, para as quais se obteve um CE_{50} de $0,96\mu\text{g/ml}$ e $0,86\mu\text{g/ml}$, respectivamente. Neste trabalho as atividades antioxidantes para o mel e os cinco extratos foram expressas como valores de CE_{50} (concentração que causa 50% de inibição). Desta forma, quanto menor o valor de CE_{50} maior é a capacidade antioxidante da amostra, como mostra a tabela 1, com valores resultantes da média de três determinações.

Tabela 1. Valores de CE_{50} para os méis e seus respectivos extratos em éter e acetato.

Extratos	CE_{50} [$\mu\text{g/mL} \pm \text{DP}$]
EMM (metanol)	$38,5 \pm 0,41$
EMAc (acetato de etila)	$40,5 \pm 0,89$
EME (éter)	$41,8 \pm 1,76$
EAPAc (água/AcOEt)	$54,6 \pm 1,35$
EAPAc2(água pH=2/AcOEt)	$42,3 \pm 0,21$

DP = desvio padrão

Dentre as amostras analisadas, o mel apresentou o CE_{50} de $52,7\text{mg/mL}$ e a maior atividade antioxidante foi obtida para o extrato metanólico (EMM), com o CE_{50} de $38,5\mu\text{g/mL}$.

Conclusões

O estudo mostrou correlação significativa entre as substâncias fenólicas presentes no mel e sua atividade antioxidante. Esta propriedade deve ser divulgada de modo a promover o consumo do mel e a valorizar o produto junto do consumidor. Vale salientar que a composição e as propriedades do mel variam de acordo com a origem floral e/ou geográfica.

Agradecimentos

A CAPES e FAPERJ pelos auxílios.

¹ Socha, R. et al. *Food Chemistry*. **2009**, 113, 568–574.

² Vianna, C.A.F.J. et al. XII Encontro Regional da SBQ. **2009**.

³ Silva, S. et al. *Food Science and Technology International*. **2006**, 12(5), 385-396.

⁴ Lianda, R.L.P. *Tese de Doutorado*, PPGQ-UFRRJ. **2009**.