Síntese de (Z)-estanhobutenóinos através de reações de acoplamento cruzado tipo Sonogashira - Parte 2

Carlos E. D. Nazario (PG),¹ Palimécio G. Guerrero Jr.(PQ),² Sandro L. Barbosa (PQ),³ Amanda S. Santana (PG),⁴ Luiz H. Viana (PQ),⁴ Gabriela R. Hurtado (PQ),⁴ Adriano C. M. Baroni (PQ)*⁴
*adriano@nin.ufms.br

¹ Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São Paulo – USP, São Carlos/SP – Brasil,

² Depto Biologia e Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Curitiba/PR – Brasil

³ Depto Farmácia-Bioquímica, Univ. Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina/MG – Brasil,

⁴ Deptos Farmácia-Bioquímica e Química – Univ. Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Campo Grande/MS – Brasil.

Palavras Chave: (E)-1-iodovinilestananas, (Z)-estanhobutenóinos, TBAOH, acoplamento tipo Sonogashira.

Introdução

A síntese de compostos vinílicos contendo dois grupamentos diferentes (SnBu₃, TeBu, I, Br, SePh) ligados ao mesmo carbono sp² tem sido alvo de estudo de nosso grupo de pesquisa.¹ Nos últimos anos temos nos concentrado no estudo da reatividade de (E)-idovinilestananas principalmente na retirada seletiva de um dos heteroátomos deste intermediário através de reações apropriadas. Em trabalho anterior² mostramos nossos resultados de um estudo sistemático de preparação de (Z)-estanhobutenóinos através da retirada seletiva do átomo de iodo em (E)-idovinilestananas através de reações de acoplamento cruzado do tipo Sonogashira. O sistema catalítico Pd(PPh₃)₄/CuI/TBAOH_{aq.} em uma mistura apropriada de solventes demonstrou ótimos resultados com tempo reacional baixo (10min) e altos rendimentos.

Resultados e Discussão

Dando continuidade a este trabalho e visando demonstrar a generalidade da reação de Sonogashira com este sistema catalítico estendemos nossos estudos com outros exemplos. Neste trabalho foi necessário realizar um amplo estudo das condições reacionais mais apropriadas visando a preparação de **2a** de forma pura pois os resultados iniciais utilizando o sistema catalítico Pd(PPh₃)₄/CuI e TBAOH_{aq.} mostraram que **2b** estava sendo formado (Esquema 1, Tabela 1, linha 1,2 e 3).

Esquema 1. Produtos formados na reação de acoplamento cruzado tipo Sonogashira.

A adição lenta de TBAOH_{aq.} ao sistema reacional favoreceu a formação do produto desejado **2a** (linha 4), bem como a sua adição diluída (linhas 6-9), sendo a condição representada na linha 9 o mais favorável para a obtenção do (Z)-1-fenil-4-pentil-2-tributylestano-1-buten-3-ino **2a** (84% rendimento).

33^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

Tabela 1. Condições empregadas no acoplamento tipo Sonogashira.

	Condição reacional	Tempo (min)	Proporção 2a:2b ^a
1	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/MeOH (4:3), t.a.	10	4:1
2	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/ <i>iso</i> -PrOH (4:3), t.a.	10	2,5:1
3	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq. rápido, THF/MeOH (4:3), t.a.	10	1:4
4	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq. lento, THF/MeOH (4:3), t.a.	10	15:1
5	Pd(PPh ₃) ₄ 20%/CuI 20%, TBAOH _{aq.} 1,5 eq. lento, THF/MeOH (4:3), t.a.	10	10:1
6	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/THF ^b /MeOH (3:3:3), t.a.	10	11:1
7	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/MeOH ^b (3:3), t.a.	10	15:1
8	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/MeOH ^b /H ₂ O ^b (3:1,5:0,85), t.a.	10	10:1
9	Pd(PPh ₃) ₄ 5% / CuI 10%, TBAOH _{aq.} 2 eq., THF/MeOH ^b (2:3), t.a.	10	22:1 ^c

^a Proporção produto: vinílico de configuração *trans* detectada por RMN ¹H (300 MHz). ^b Usado para diluir o TBAOH_{aq.}

Conclusões

Neste trabalho demonstramos que o sistema catalítico representado pela linha 9 é uma ótima alternativa para a preparação de (Z)-estanhobutenóinos em bons rendimentos e com minimização de formação de sub-produtos.

Agradecimentos

FUNDECT-MS, PROPP-UFMS, CNPq, CAPES.

¹ a) Dabdoub, M. J.; Baroni, A. C. M. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 54. b) Dabdoub M. J.; Dabdoub V. B.; Baroni A. C. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 9694. ² Baroni, A. C. M.; Nazario, C. E.; Viana; L. H., Kawasoko, C. Y., Santana A. S. 31^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008, p.QO082 – 147.