Estudo de *docking* molecular com análogos da timidina inibidores da TMPK do *Mycobacterium tuberculosis*

Natanael D. Segretti (PG)^{1*} (natana08@hotmail.com), Renata V. Bueno (PG)², Carolina H. Andrade (PQ)², Elizabeth I. Ferreira (PQ)¹, Gustavo H. G. Trossini (PQ)¹

¹LAPEN, Av. Prof. Lineu Prestes, no. 580, bloco 13-superior, Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, CEP-05508-900.

²LabMol, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás.

Palavras Chave: Tuberculose, TMPK, *docking*.

Introdução

A tuberculose (TB) é doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*). Em 2010, a OMS estimou 8,8 milhões de novos casos dessa doença no mundo¹. O retorno da TB em grande proporção é atribuído a fatores como a coinfeção com HIV e ao aparecimento de cepas multi- e extensivamente resistentes aos fármacos anti-TB convencionalmente utilizados². Assim, é essencial a busca por novos alvos moleculares para o desenvolvimento de tuberculostáticos mais potentes e seletivos. A timidina monofosfato quinase encontrada no *Mtb* (TMPK_{mt}) é um alvo bastante promissor. Ela é responsável pela conversão, dependente de fosfato, da desoxitimidina monofosfato (dTMP) em desoxitimidina difosfato (dTDP), possui apenas 22% de similaridade com seu homólogo presente no ser humano e atua na junção das vias selvagem e *de novo* do metabolismo da timidina trifosfato (TTP), sendo a última enzima específica na rota biossintética da TTP³. Face ao exposto, o presente trabalho descreve o estudo de *docking* molecular de 109 análogos da timidina, recentemente sintetizados⁴⁻¹¹, inibidores da TMPK_{mt} com o propósito de analisar a interação destes inibidores com o sítio ativo da enzima alvo.

Resultados e Discussão

As estruturas 3D dos análogos foram geradas no programa OMEGA (QUACPAC-AM1-BCC). A estrutura cristalográfica da TMPK_{mt} (PDB:1G3U) foi pré-processada utilizando o programa CHIMERA 1.5.3. As simulações de *docking* dos compostos ao sítio ativo foram realizadas usando os softwares AutoDock Vina e GOLD 4.2. Neste estudo, considerou-se a proteína tanto na forma rígida quanto na forma flexível em alguns resíduos específicos para avaliação do melhor modo de interação dos compostos. Obtiveram-se, pelo menos, 10 conformações diferentes para cada ligante. Devido à diversidade estrutural e à presença de grupos volumosos nas estruturas dos ligantes, os resultados obtidos considerando os resíduos flexíveis foram mais representativos para a série de

estruturas. Tal fato se deve a possíveis impedimentos estéricos existentes. Todos os ligantes da série apresentaram bom perfil de interação com o sítio ativo da enzima alvo, quando a metodologia empregada considerou os resíduos Asp9, Tyr39, Arg74, Arg95, Asn100 totalmente flexíveis. Observou-se, também, que a melhor pose de *docking* para cada ligante segue a orientação espacial do ligante co-cristalizado dTMP (Figura 1).

Figura 1. *Docking* do análogo 83 no sítio ativo da TMPK_{mt}, comparado ao substrato co-cristalizado em relação ao dTMP. N=azul, H=branco, O=vermelho, P=laranja e C rosa 83/ azul dTMP

Conclusões

Apesar de resultados semelhantes, o programa GOLD 4.2 mostrou melhor desempenho para todos os 109 análogos. A utilização do método de *docking* considerando resíduos flexíveis possibilitou melhor ancoramento dos ligantes, com perfil de *docking* que corrobora com os dados experimentais de atividade biológica indicativos da interação dos inibidores com o sítio ativo da enzima.

Agradecimentos

FAPESP (Projeto 2011/11499-0), CNPq, CAPES

¹WHO: http://www.who.int/tb/publications/global_reports/2011/gtrb acessado em janeiro de 2011.

²Ducati, R. G. *et al. Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* **2006**, *101*, 699.

³Munier-Lehmann, H. *et al. Protein Sci.* **2001**, *10*, 1196.

⁴Familiar, O. *et al. Chem. Med. Chem.* **2008**, *3*, 1083.

⁵Familiar, O. *et al. Eur. J. Med. Chem.* **2010**, *45*, 5910.

⁶Pochet, S. *et al. Chem. Bio. Chem.* **2003**, *4*, 742.

⁷Van Daele, I. *et al. Chem. Med. Chem.* **2006**, *1*, 1081.

⁸Van Daele, I. *et al. J. Med. Chem.* **2007**, *50*, 5281.

⁹Vanheusden, V. *et al. Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2002**, *12*, 2695.

¹⁰Vanheusden, V. *et al. J. Med. Chem.* **2003**, *46*, 3811

¹¹Vanheusden, V. *et al. Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2003**, *13*, 3045.